

■ 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(분류)	200mg
티아만질산염(KP)	4mg
파리독신염산염(KP)	4mg
니코틴산아미드(KP)	12mg
판토텐산칼슘(KP)	8mg
시아노코발라민(KP)	1.2μg
착색제 : 식약청인정타르색소(청색1호, 황색5호, 황색203호)	

■ 성 상 : 황갈색의 내용물을 함유한 황녹색의 장방형 연질캡슐

■ 효능 · 효과 : 다음 질환의 치료 보조 : 만성 간질환, 지방간, 간경변, 중독성 간질환

■ 용법 · 용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 저장 방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 소비자상담실 : 02) 923-8916

■ 제조원 : **동국약품** / 경기도 화성시 향남읍 상산리 901-3

■ 판매원 : **KBC 한국바이오팜(주)** / 충북 진천군 덕산면 석정리 407

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁해결기준에 따라 교환 · 환불받을 수 있습니다.

※ 작성일(2009년 11월 16일) 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.dongkoo.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

제조번호 : 15410012

사용기한 : 2011. 11. 09

일반의약품



HEPALON

헤파론

연질
캡슐

카르두스마리아누스엑스 200mg 함유

KBC 한국바이오팜주식회사

240캡슐

· 간장 보호

· 만성 간질환

· 비타민 보충

■ 사용상의 주의사항

1. 복용시 다음 사항에 주의합니다.
 - 1) 정해진 용법, 용량을 지킵니다.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.
2. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의합니다.
 - 1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
3. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
4. 다음 환자에는 신중히 투여합니다 : 고지단백혈중, 당뇨병성고지혈증 및 해장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
5. 일반적 주의 : 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 볼 수 있도록(습기가 적고) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관합니다.
 - 3) 오염을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.



1 88 06573 03832 2