

콧물, 코막힘, '재채기'에

씨러젠정

Cirugen Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

염산세티리진(비.피) 5mg

염산슈도에페드린(유.에스.피) 120mg

【성 상】 백색의 원형의 필름코팅정

【효능·효과】 다음증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염의 완화:
코막힘, 재채기, 콧물, 눈·코의 소양증

【용법·용량】

- 12세 이상의 소아와 성인 : 식사에 관계없이 1일 2회, 1회 1정씩(아침,저녁) 복용하십시오.
- 본제의 투여는 2~3주를 넘지 않도록 하십시오.
- 신장 기능 이상 환자의 경우 상용량의 1/2을 투여하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 또는 ephedrine 또는 Piperazine류에 과민증이 있는 환자
- 2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상 동맥환자
- 3) monoamine oxidase 저해제를 투여받고 있는 환자
- 4) 안내압이 증가되어 있거나 뇨저류가 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장 및 간기능 부전환자
- 2) 교감신경양 약물(코막힘 제거약, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여받는 환자
- 3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여받는 환자

3. 부작용

- 1) 목마름, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움, 구역 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타납니다.
- 2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 떨림, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계, 허탈 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민반응이 일어날 수 있습니다.

4. 상호작용

- 1) monoamine oxidase 저해제, β_2 -교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킵니다.
MAO 저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO 저해제 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용하십시오.
- 2) 교감신경양 아민은 methyl dopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소 시킵니다.
- 3) 슈도에페드린을 디기탈리스와 병용투여할 때 전위성 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있습니다.
- 4) 슈도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수 속도가 감소됩니다.
- 5) 임신부에 대한 안전성은 확립되지 않았으므로 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 하십시오.

6. 과량 투여시의 처치

과량투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경 억제 효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계, 허탈 등) 또는 자극효과(불면, 환각, 떨림, 경련)가 나타날 수 있습니다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 하십시오. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절하십시오. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥 투여하십시오.

7. 기타

운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요합니다.

【포 장 단 위】 자사포장단위

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

※본 의약품은 우수의약품제조관리기준 (KGMP)을 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다.

기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바라며, 제품의 변경사항은 당사 홈페이지 (www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재되오니 참고하시기 바랍니다. Tel : 02-876-7777(대)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.



생명공학 벤처제약기업

[주] 뉴젠팜

본사:서울시 관악구 봉천 7동 1596-7

공장:전북 익산시 석암동 649

우수 의약품 제조관리기준

KGMP 적격 지정업체

P-3-2-265 0002