


보령제약

렉스판정



근육이완작용 / 근육경련완화

JSP

근육통증

어깨통증

어리통증

관절통증

10정

KGMP우수약품
제조적격업체
일반의약품 / 분류번호: 114

렉스판정



[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
- 3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
가) 심한 간, 신장에 신장장애 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자
- 4) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우월)한다고 판단되는 경우 투여합니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 과민증: 두드러기, 발적증현 등이 부어짐, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지하십시오. 드물게 알레르기성 피부발진, 정상출혈혈청점, 반상출혈 피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내피출혈, 오변색소변이 변함 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈관신장성 부종(두기) 또는 아니말리아증상이 나타날 수 있습니다.

- 2) 간장: 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지하십시오.

- 3) 소화기: 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.

- 4) 청신경계: 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.
- 5) 알코올이나 중추신경억제제와 병용할 경우 복용량에서 상가작용이 나타나므로 신중히 투여하십시오.

6. 저장 시 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 닫은 용기에 넣지 마십시오.
[저장방법] 기밀용기 실온(약 30℃) 보관 [포장단위] 10정

- 약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 약품과 함께 보관하십시오.
- 본 약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공작거래원에게 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 약품용 용어설명 및 기타 자세한 약품정보는 온라인약력도서관(<http://drug.mtbs.go.kr>)의 약품 정보를 참조하십시오.
- 부자유 보고: 한국약품 안전관리원 (1644-6223)
- 기타 자세한 사항이나 문의의 책임질기 위해 변경된 내용을 소비자상담실(800-559-7575)로 문의하시기 바랍니다.

[판매처]

BORYUNG
보령 제약
경기도 화성시 단원로 907-109
www.boryung.co.kr

제조처
주)씨트리트
서울특별시 강남구 테헤란로 519 2F
대표이사: 김민준 대표이사: 김민준
대표이사: 김민준 대표이사: 김민준

[4010239-4]

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

아세트아미노펜(KP)..... 300.0mg
클로르록사존(KP)..... 250.0mg

[성 상] 흰색의 장방형 정제

[효능·효과] 신경통, 근육통, 관절통, 요(허리)통, 염좌통(뻐) 통증, 건통(어깨결림), 근경련(근육 경련), 근경직증 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질현(여러 질현)

[용법·용량]

성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈식)을 시하여 복용하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

정제