

기침 · 가래에... 케어코프 캡슐

분류번호: 222

일반의약품

CARE-COUGH Cap.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

노스카핀(약전).....	10mg
dl-염산메칠에페드린(약전).....	12.5mg
말레인산카르비복사민(USP).....	2mg
구아아쿨실폰산칼륨(약전).....	46.67mg
(무수물로서 45mg)	
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전).....	10mg
· 공캡슐: 젤라틴(기원: 소, 사용: 가축)	

【내용량】

- 케어코프 10캡슐: 175mg × 10캡슐(총 중량 1.75g)
- 케어코프 200캡슐: 175mg × 200캡슐(총 중량 35.0g)
- 케어코프 500캡슐: 175mg × 500캡슐(총 중량 87.5g)

【성 상】

흰색의 분말이 든 상부 흰색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】 기침, 가래

〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다〉

【용법 · 용량】 성인: 1회 2캡슐, 1일 3회 식후복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 환자
2) 지금까지 이 약이나 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 허약자, 고령환자
4) 심장애 및 고혈압 환자, 고령자, 수유부
5) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등)환자, 소변 보기 거북한 환자
6) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 이상반응

- 1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 입맛없음, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

5. 상호작용

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 함께복용하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여

7세 이하의 영 · 유아에는 시럽제를 투여한다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10, 200, 500캡슐

【사용기간】 제조일로부터 36개월

* 본 제품은 '우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)'에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

* 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2006년 07월 31일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일: 2006년 07월 31일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준

KGMP적격업소제품