일반의약품
분류번호:141

알레르기 비염 치료제

씨노코 캡슐

Sinoco Cap.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중
염산세티리진(식품의약품안전청고시) ····· 5 mg
염산슈도에페드린(유.에스.피.) ····· 120 mg

【성 상】 백색의 구형과립이 들어있는 상부 자색, 하부 투명한 경질캡슐제

【효능 · 효과】
다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염의 완화 : 코막힘, 재채기, 콧물, 눈, 코의 소양증

【용법 · 용량】
- 12세 이상의 소아와 성인 : 식사에 관계없이 1일 2회, 1회 1캡슐씩(아침,저녁)복용한다.
- 본제의 투여는 2-3주를 넘지 않도록 할 것
- 신장 기능 이상 환자의 경우 상용량의 1/2을 투여할 것

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말것.
   (1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자
   (2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상 동맥 환자
   (3) monoamine oxidase 저해제를 투여받고 있는 환자
   (4) 안내압이 증가되어 있거나 뇨저류가 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   (1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈박, 부정맥, 신장 및 간기능 부전환자
   (2) 교감신경양 약물(비충혈제거약, 식욕억제제, amphetamine 등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여받은 환자
   (3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여받은 환자
3. 부작용
   (1) 구갈, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈박, 신경과민증, 어지러움증, 현훈, 오심 등이 투여대상 중 1% 이상에서 나타났다.
   (2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈 등이 나타날 수 있다.
   (3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민반응이 일어날 수 있다.
4. 상호작용
   (1) monoamine oxidase 저해제, β_2-교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가시킨다. MAO 저해제의 긴 작용시간 때문에 MAO 저해제 투여 최소 15일후 이 약물을 복용한다.
   (2) 교감신경양 아민은 methyldopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킨다.
   (3) 슈도에페드린을 디기탈리스와 병용 투여할 때 전위성 심박 조율기의 활성이 증가될수 있다.
   (4) 슈도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면 카올린에 의해 흡수속도가 감소된다.
5. 임산부에 대한 안전성은 확립되지 않았으며 이 약물은 모유로 분비되므로 수유부는 복용하지 않도록 한다.
6. 과량투여시의 처치
   과량 투여시 빈박, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진토, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 진전, 경련)가 나타날 수 있다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 한다. 위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈박은 β -억제약으로 조절한다. 경련이 나타나면 디아제팜을 정맥투여한다.
7. 기타 : 운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요한다.

【저장방법】 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

♣ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질 · 변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
CNC111803-00

제조 · 발매원
SUDO 수도약품공업주식회사
본사 · 공장:경기도 화성시 향남면 상신리 902-5
서 울:서울시 서초구 서초동 1599-11
(소비자상담실) 080-080-4211