신경통 · 근육통 · 요통

에소펜정

일반의약품

분류번호:114

* 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

[원료약품 및 그 분량]

1정(670mg) 중

아세트아미노펜(약 전) ····· 300mg

클로르족사존 (약 전) ····· 250mg

[성 상]

연분홍색의 원형 정제

[본제의 특징]

1.근이완 작용과 진통작용의 상승효과

에소펜정은 근이완작용이 뛰어난 클로르족사존과 해열 진통 작용이 있는 아세트아미노펜을 복합처방하여 **신경통, 관절통, 요통, 염좌통, 견통 등의 진통작용과 함께 근경련, 근이완 · 진통제입니다.**

2.신속한 효과발현

에소펜정은 경구투여 후 1~2시간내에 최고 혈중농도에 도달하여 근육긴장, 근육통 등의 제반증상을 치료하는 효과 빠른 근이완 · 진통제입니다.

[효능 • 효과]

신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통, 견통, 근경련, 근경직등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환

▶위 효능 • 효과와 다른 용도로 사용시에는 심각한 부작용이 일어날 수 있다.

[용법 • 용량]

성인: 1회 2정 1일 4회까지 공복시를 피하여 복용한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1.경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2.다음 환자에는 투여하지 말 것

1)클로르족사존에 과민증 환자

2)아세트아미노펜에 과민증 환자

3)지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술등))을 일으킨 적이 있는 사람

4)지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3.복용시 주의 사항

1)이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.

-이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, **수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우**

-고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

-천식이 나타난 경우

2)바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4.다음 환자에는 신중히 투여할 것

1)심한 간, 신장애 환자

2)알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

5.부작용

1)과민증 : 두드러기, 발적, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈, 반상출혈, 요변색 등이 나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있다.

2)간장 : 클로르족사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지한다.

3)소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.

4)정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

6.임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다

7.상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여한다

8.저장상의 주의사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2)직사광선을 피하고 될 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관 할 것

3)오용을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

[저장방법]

• 밀폐용기

• 실온보관(1℃ ~30℃)

• 저장상의 주의사항 참조

[포장단위]

자사포장단위

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※소비자 상담전화(마케팅부):080 - 577 - 8004(수신자 요금부담서비스)

E-mail:hanaph@hanaph.co.kr

작성년월 : 03. 09. 〈H01〉

제조 · 판매원

하나제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 907-3