



시원하고 효과적인
투어펜 **쿨**
플라스타
(플루르비프로펜 20mg)

일반의약품

분류번호:264

[원료약품의 분량] 1매 (70cm², 2.40g) 중
플루르비프로펜 (케이.피.) 20mg

[성 성]

무색투명한 점착성 물질을 지지체에 도포하고 고체면에 바리지를 덮은 첩부제

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 진통, 소염

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. 퇴행성관절염(골관절염) | 4. 상완골상과염(테니스엘보우 등) |
| 2. 어깨관절주위염 | 5. 근육통 |
| 3. 건·건초염 | 6. 외상후의 종창·동통 |

[용법·용량]

약면의 바리지를 떼어낸 후 환부에 1일 2회 부착하십시오.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 않습니다.
 - 이 약 및 기타의 플루르비프로펜 제제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 아스피린 천식(비스테로이드성 소염진통제 등에 의한 천식발작의 유발) 또는 그 병력이 있는 환자(천식발작을 유발하는 경우가 있습니다)
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
기관지 천식 환자(천식발작을 일으킬 수 있습니다)
- 부작용
 - 때때로 발적, 발진, 약진, 가려움 및 작열감, 접촉피부염이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
 - 천식발작을 유발할 수 있으므로 간성수포음, 천명, 호흡곤란 등의 초기증상이 나타날 경우에는 사용을 중지하십시오.
천식발작은 이 약의 부착 후 수시간 내에 나타납니다.
- 일반적 주의
 - 소염진통제에 의한 치료는 원인요법에 아닌 대증요법에 유의하십시오.
 - 피부감염증을 불현상화 시킬 수 있으므로 감염을 수반하는 염증에 사용하는 경우에는 적절한 항균제 또는 항진균제를 병용하고 충분히 관찰하여 신중히 투여하십시오.
 - 민성질환(퇴행성관절염(골관절염) 등)에 이 약을 사용할 경우에는 약물요법 이외의 요법도 고려하십시오. 또한 환자의 상태를 충분히 관찰하여 부작용 발생에 유의하십시오.

- 임부에 대한 투여
임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여하십시오.
- 소아에 대한 투여
소아에는 안전성이 확립되어 있지 않습니다. (사용경험이 적습니다)
- 고령자에 대한 투여
고령자에는 이 약의 부착 부위의 피부상태에 주의하며 신중히 투여하십시오.
- 적응상의 주의
 - 손상된 피부와 점막에는 사용하지 마십시오.
 - 습진 또는 발진부위에는 사용하지 마십시오.
 - 적응부위의 따끔을 겪어낸 후 사용하십시오.

[저장 방법 및 사용기간] 차광기밀용기, 실온보관, 제조일로부터 3년

※ 투어펜 플라스타 사용방법

- 환부를 깨끗이 하고 건조상태에서 부착하십시오.
- 무릎에 부착하실때에는 45도 굽힌상태에서 부착하십시오.
- 손목 손가락 관절에는 적당한 크기로 잘라서 사용하십시오.

※제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※구입시 사용기한이 경과 되었거나 유통과정 중 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재경정제보고서 "소비자 피해보상 규정"에 의거 소비자 주의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본 설명서 작성(개정) 년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.
설명서 작성년월일 : 2007. 4. 30.

■ 제품문의 02) 2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 장안 2동 315-18
공장 : 충청북도 충주시 양성면 본평리 산 5-1