

종합빈혈 치료제 페롱캡슐 Felong Cap.

분류번호 : 322 무기질제제

일반약품

【원료약품 및 그 분량】 캡슐 중

폴리사카리드철착염(KP)	3261 mg
〈철(Fe)로서 150mg〉	
폴산(KP)	1 mg
시아노코발라민(KP)	25 µg
동물유래성분(참가제) : 유당수화물(소,우유)	

【성 성】 흑갈색의 분말이 충전된 상 · 하부 질은 갈색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

【용법 · 용량】 성인 : 일 회 1캡슐을 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

철 함유제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분들의 과민반응 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(갓난아이)
- 3) 혈액소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증(조직장애는 일으키지 않으나 국소적 또는 전신적으로 조직의(헤모시데린으로서의) 철 함유량이 증가한 상태) 환자
- 4) 비철결핍성빈혈(예 : 비타민 B12 결핍에 의한 거대적아구성 빈혈) 환자
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염
- 2) 경구용테트라사이클린계 제제
- 3) 제산제

4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

녹차, 홍차등 탄닌을 함유하는 차 및 우유 · 유제품은 복용 중, 복용전후에는 피할 것.

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애(신장장애) 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부, 수유부
- 7) 항알도스테론제, 트라마데렌과 함께 복용하는 사람(고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
- 8) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 첨부 문서를 소지할 것.
 - 1) 때때로 흥분, 피부질환, 가려움, 전신경련, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타나는 경우
 - 2) 두드러기, 가려움, 햇빛에 의한 피부 과민반응
 - 3) 복부 · 위통증, 위 경련
 - 4) 구토, 설사
 - 5) 열, 혼수
 - 6) 구역, 식욕부진, 체중감소, 부종, 복통, 설사, 변비, 흑변, 위부불쾌감
 - 7) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
 - 8) 대장투여로 인해 복부(배부분) 통증, 구토, 구역, 설사, 흑변, 토혈, 저혈압, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종, 빈맥, 대사성산증, 고지혈증, 탈수, 졸음, 창백, 권태, 발작, 속, 혼수

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 3) 치료를 시작하기 전에 빈혈의 유형과 그 원인을 파악해야 한다. 빈혈은 혈액 손실과 같은 전신적인 장애에 의해 발생할 수 있으므로, 가능한 한 이러한 원인들이 먼저 치료되어야 한다.
- 4) 이 약에 함유된 폴산은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B12제제와 병용한다. 다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 되므로 주의할 것.
- 5) 아스코르빈산(비타민 C) 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(단단히 마개로 막아) 보관할 것.
- 3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30캡슐, 60캡슐, 60캡슐 X 2개입

【소비자상담실】 ☎080-024-0030(수신자 부담 콜로버서비스)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품을 복용할 때에 캡슐이 기도에 걸릴수도 있으니 유의하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 어린이의 약물사고 방지를 위해 안전용기 포장을 하였습니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해 드립니다.

※ 본 첨부문의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 전자민원창구(ezdrug.kda.go.kr)의 '의약품등 정보란' 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2015.02.11

광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com

E.I.150211

 Kwangdong