

신경통 · 근육통 · 관절통 · 어깨결림

클록펜정

Clocpen Tab.

【원료약품 및 분량】 1정 중

아세트아미노펜(KP) 300mg

클로르록사존(KP) 250mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】 흰색의 장방형 정제

【효능·효과】 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통(뻘 통증), 건통(어깨결림), 근경련(근육경련), 근경직(근육경직) 등 근육의 이상 긴장을 수반 하는 제질환(여러 질환)

【용법·용량】 성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복(빈속)시를 피하여 복용합니다.
연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 1) 클로르록사존에 과민증 환자
 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자
 3) 지금까지 이 약에 의한 과민증(예를 들면, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
 4) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 1) 실한 간, 신장(신장장애) 환자
 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 마십시오.
이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다.
- 다음 주의사항
 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워 지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 ② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 ③ 천식이 나타난 경우
 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 부작용
 1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지합니다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈(피부에 검보랏빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 요변색(소변색이 변함) 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시스 증상이 나타날 수 있습니다.
 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지합니다.
 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.
 4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.
- 임부에 대한 투여
임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 이익성이 위험성을 상회(우돌)한다고 판단되는 경우 투여합니다.
- 상호작용
알코올이나 중추신경억제제와 병용투여(함께복용)시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여합니다.
- 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 대로 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질을 보존하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 상온(15~25℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 온라인 의약품서관(drug.mids.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문인작성일자 : 2015. 04. 30. (Rev. 3)



제조사
|주 CMG 제약

경기도 시흥시 공단 1로 27번길 27