

AMICO^{Tab.}

아미코정 / 500정

- ▶ 분류번호 : 141 ▶ 성상 : 분홍색의 장방형 정제
- ▶ 성분 · 함량 : 1정중
말레인산클로르페니라민(약전)4mg 염산페닐에프린(약전) 10mg
- ▶ 효능 · 효과 : 1. 감기 또는 알레르기성 및 혈관운동성 비염에 의한 다음 증상의 완화 - 재채기, 콧물, 코막힘, 눈물
2. 부비동염에 의한 비출혈의 일시적 경감.
- ▶ 용법 · 용량 : 1) 성인(만 12세 이상) : 4시간마다 1정씩 복용하되, 24시간동안 6정을 초과하지 않거나 의사의 지시에 따른다. 2) 만 6-12세 소아 : 4시간마다 1/2정씩 복용하되, 24시간동안 3정을 초과하지 않거나 의사의 지시에 따른다. 3) 만 6세 이하 소아 : 의사의 지시에 따른다.
- ▶ 사용상의 주의사항
1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
 2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것. 1) 아민계 교감신경항진제, 항히스타민제, 기타 이 약의 성분에 과민성인 환자 2) 특이체질 환자 3) 수유부 4) 중증의 고혈압 환자, 중증의 관상동맥질환 환자, MAO 저해제 치료를 받고 있는 환자 5) 협우각성 녹내장, 뇨저류, 소화성궤양, 천식, 폐기종, 만성폐질환, 숨이 차거나 호흡곤란이 있는 환자 6) 진정제, 신경안정제를 투여 받고 있는 환자
 3. 다음 경우에는 신중히 투여할 것. : 만성 기관지염 등의 호흡곤란, 심질환, 고혈압, 갑상선기능질환, 당뇨병, 녹내장, 전립선 비대증으로 인한 배뇨곤란을 가진 환자는 의사의 지시가 없는 한 복용하지 말 것.
 4. 부작용 1) 교감신경아민을 포함한 약제는 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있다. : 공포, 불안, 긴장, 진전, 쇠약, 창백, 호흡곤란, 배뇨곤란, 불면, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 어지러움, 저혈압을 동반한 심혈관 허탈 2) 페닐에프린에 과민인 사람은 빈맥, 두통, 두통, 어지러움, 오심등의 에페드린양 반응이 나타날 수 있다. 그러나 페닐에프린을 적량 투여시는 이런 부작용이 나타나지 않는 안전한 약물이다. 3) 항히스타민제에 과민인 사람은 중증도의 진정작용을 나타낼 수 있다. 4) 항히스타민제로 인한 다른 부작용은 구갈, 어지러움, 쇠약, 식욕부진, 오심, 구토, 두통, 신경과민, 다뇨증, 가슴앓이, 복시, 배뇨곤란 등이 있고 드물게 피부염이 나타날 수 있다.
 - 5) 졸음을 일으킬 수 있으며, 알코올, 진정제, 신경안정제 등이 졸음을 증가시킬 수 있다. 6) 어린이에게는 특히 흥분이 나타날 수 있다.
 5. 일반적 주의 1) 7일 이내에 증상의 개선이 나타나지 않거나 고열을 동반할 때에는 의사와 상의할 것. 2) 이 약의 복용중에는 알코올성 음료를 피한다. 3) 이 약의 복용 중 자동차운전 및 위험한 기계작동 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 한다. 4) 용량을 초과하지 않도록 하고, 사고로 과량복용시에는 의사와 상의할 것. 5) 이 약의 복용에 의해 어지러움, 불면, 신경과민 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사와 상의할 것.
 6. 보관 및 취급상의 주의 : 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- ▶ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1-30℃) ▶ 일반의약품

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

문안작성일 : 2004.11.19



8 806103 905424

제조번호 :

사용기한 :



주 | 셀라트팜코리아

경기도 시흥시 대야동 418-21 (02)312-7500

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://www.cellart.com>이나 02)312-7500(학술부)에서 확인할 수 있습니다.