

KGMP적격업체

ISO9001인증업체

마로엘정

Maroel Tab.



500정

【성 상】 흰색의 타원형 정제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

수산화마그네슘(USP) 500mg

노회엑스(EP) 100mg

(히드록시안트라센유도체로서 18mg)

우르소데스옥시콜린산(약전) 10mg

【효능 및 효과】

· 변비 · 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법 및 용량】

1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11~14세 1일 2회를 식전(식간 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초효는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자 2) 장폐색 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 심한 복통 또는 구역, 구토 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

3) 신장질환자

4) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3. 부작용

이 약을 투여함으로써 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다. 2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여한다.

3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

5. 소아에 대한 투여

1) 이 약은 7세 미만의 영·유아에게 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 (습기가 적은) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관한다.

3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.

Rev. 1



조아제약(주)
CHO-A PHARM CO., LTD.

본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

제조번호 :

사용기한 :



8