천연칼슘보급 및 골형성 촉진제

지오케어정
GEOCARE Tab.

일반의약품
분류번호:316
우수의약품
KGMP
적격업체

지오케어정은 뼈형성의 생리학적 활성율을 높여 주는데 널리 처방되고 있는 오소판 물질, 과산화지질형성을 억제하고 혈액순환을 촉진하는 초산토코페롤, 각기병 및 말초신경염에 효과가 있는 질산치아민 및 낙산리보플라빈, 골밀도를 증가시켜 골연화증 및 구루병을 예방하는 에르고칼시페롤, 항산화효소를 활성화시키는 셀레늄함유건조효모, 근육경련을 완화시키는 산화마그네슘 등의 적절한 배합으로 뼈 · 이의 발육불량, 말초혈행장해에 따른 갱년기 증상, 신경통 및 각기병을 방지하고 칼슘 및 골형성을 촉진하는 의약품입니다.

【원료약품 및 그분량】 1정중

오소판물질(식약청고시 제2000-14호)	415㎎
(칼슘으로서 75.5~102.1㎎)	
초산토코페롤50%(식약청고시 제98-127호)	200㎎
(초산토코페롤로서 100㎎)	
질산치아민(약전)	15㎎
산화마그네슘(약전)	20㎎
(마그네슘으로서 12.06㎎)	
낙산리보플라빈(약전)	2㎎
에르고칼시페롤(약전)	0.025㎎
(비타민 D로서 100IU)	
셀레늄함유건조효모(식약청고시 제98-127호)	23.2㎎
(셀레늄으로서 12.5㎍)	

【성 상】 갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능 · 효과】

1. 뼈 · 이의 발육불량, 구루병의 예방
2. 말초혈행장해 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 냉증
3. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 견통 등)
4. 각기
5. 칼슘 및 미네랄의 보급

【용법 · 용량】 12세 이상 성인 : 1회 2정, 1일 2회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말것
   1) 과칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용, 신질환환자
   2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   3) 12개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의 할 것)
   1) 1세 미만의 영아
   2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민 D 또는 칼슘의 투여을 피한다.
   4) 임부, 수유부
   5) 심장, 순환기계기능 장애 환자
   6) 신장애 환자
   7) 저단백혈증 환자
3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 구역질, 피부발진, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시악취, 탈모, 조급증
   2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
   3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
   4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성 심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여한다.
   3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
   1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
   2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
      가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
   3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 임부 · 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여
   1) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
7. 임상검사치에의 영향
   1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 100정, 120정, 200정, 240정

■소비자상담실 : (02)2672-1414, (02)2672-1122

본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

I-0301

GUJU 구주제약주식회사
경기도 화성시 정남면 제기리 341-1
www.gujup.co.kr