

【원료약품의 분량】 1매(10cm×14cm, 14g)중

살리실산메틸(약전)	160mg
엘-멘톨(약전)	80mg
디엘-캄파(약전)	80mg
토코페롤아세테이트(약전).....	48mg
황백연조엑스(3.3 → 1)(식품의약품청고시).....	112mg
치자연조엑스(3.0 → 1)(식품의약품청고시).....	52.8mg

【성 상】

황색~미황색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향을 갖는 카타플라스마제입니다.

【효능·효과】

타박, 뺨, 어깨결림, 관절통, 근육통, 근육피로, 요통, 동상, 골절통

【용법·용량】 표면의 플라스틱필름을 벗기고, 환부에 1일 1~2회 부착하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 1. 다음 부위에는 사용하지 마십시오.
 - 1) 눈 주위, 점막 등
 - 2) 습진, 피부염, 상처 등
- 2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면, 발진·발적, 가려움, 피부병 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
 - 2) 소아에게 사용하실 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용하도록 하십시오.
 - 3) 피부가 약한 사람은 사용전에 팔 안쪽에 작은 조각을 붙여 발진·발적, 가려움, 피부병 등의 증상이 발현되지 않는지 확인하고나서 사용하십시오.

- 4) 땀 등을 잘 닦아내 환부를 청결하게 하고나서 붙이십시오.
- 5) 피부가 특히 약한 사람은 같은 부위에 계속해서 붙이는 것을 삼가해 주십시오.

4. 적용상의 주의

- 1) 본 제의 사용에 의해 발진·발적, 종창, 가려움 등의 이상한 증상이 나타난 경우에는 사용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- 2) 며칠간 사용하여도 증상이 개선이 나타나지 않는 경우는 사용을 중지하고, 의사 또는 약사와 상담하십시오.

5. 저장상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선이나 고온인 장소를 피하고, 가능한 한 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 품질 유지를 위해 미사용분은 봉지에 넣고, 개봉부는 지퍼를 꼭 채워 보관하십시오.
- 4) 오용을 피하고, 품질을 유지하기 위하여 제품을 다른 용기(봉지)에 옮겨 담지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품일 경우 구입하신 병·의원 또는 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 상기 표시 사항 중 작성일자(2009년 1월 22일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자 상담실(080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자



주식회사 **녹십자**

충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL. 031)260-9300
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033



분리배출

호일-10-4016-3