

류마펜 정

분류번호 : 114

일반의약품

[성분 · 함량] 1정중

아세트아미노펜 (약전) 300.0mg

클로르록사존 (약전) 250.0mg

첨가제 (타르색소) : 적색 3호

[성 상] 분홍색의 장방형 정제

[효능 · 효과] 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통, 건통, 근경련, 근경직 등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제 질환

[용법 · 용량]

성인 1회 2정, 1일 4회까지 공복시를 피하여 복용하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 클로르록사존에 과민증 환자
- 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

3. 다음 경우에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 심한 간, 신장에 환자
- 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

4. 부작용

- 1) 과민증 : 두드러기, 발적, 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투여를 중지하십시오. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈, 반상출혈, 요변색 등이 나타날 수 있습니다. 매우 드물게 혈관신경성 부종 또는 아나필락시스증상이 나타날 수 있습니다.
- 2) 간장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타나면 투여를 중지하십시오.
- 3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있습니다.
- 4) 청신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있습니다.

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여하십시오.

6. 상호작용

알코올이나 중추신경계억제제와 병용투여시 상가작용이 나타나므로 신중히 투여하십시오.

[저 장 방 법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포 장 단 위] 자사포장단위

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.
본 제품은 공정거래위원회 고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
기타 자세한 사항은 삼익제약 홈페이지(www.samik.co.kr) 또는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보를 참조하세요. 110119



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청천1동 374-1
학술/개발부 : (02)928-0661