



콘드로이틴설페이트 함유 관절 영양제

메가콘트로 연질캡슐


분류번호: 03160

성분 · 함량 1캡슐(1,570mg)중

콘드로이틴설페이트나트륨(KPC)	300.0mg
티아민질산염(KP)	15.0mg
토코페롤아세테이트(비타민E로서 10.0IU)(KP)	10.0mg
니코틴산아미드(KP)	30.0mg
피리독신염산염(KP)	25.0mg
판토텐산칼슘(KP)	15.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6.0mg
시아노코발라민 0.1% (시아노코발라민으로서 30μg)(KPC)	30.0mg
마늘엑스(100→1)(KPC)	5.0mg
γ-오리자놀(KPC)	5.0mg
첨가제(타르색소) : 황색5호, 청색1호, 적색40호	

성 상 황색의 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

용법 · 용량 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐씩 식후 복용



- ※ 그림과 같이 캡슐 포장의 불룩한 부분을 화살표 방향으로 누르고 캡슐만 꺼내 복용합니다. 이때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.
※ 충분한 양의 물과 함께 복용합니다.

효능 · 효과

- 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - (1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - (5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - 구역, 구토, 묽은 변
 - 식욕부진, 복부팽만감
 - (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

- (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
 - (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
 - (3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것
 - (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - (5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
 - (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
 - (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

사용기한 외부포장에 표기

포장단위 60캡슐, 120캡슐

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성일자(2012년 06월) 이후 변경된 내용은 소비자상담실 또는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

설명서 작성일 : 2012. 06

제조원

RP Corp

(주)알피 Corp
경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

판매원



유현양행

서울시 동작구 대방동 49-6