

항히스타민제

씨 판 정

세티리진염산염 /
수도에페드린염산염



항히스타민제

씨 판 정

Cipan Tab.

전문의학용
분류번호:01410

■ **성분 · 함량** 1정 중 세티리진염산염(BP).....5mg / 수도에페드린염산염(USP).....120mg

첨가제(타르색소): 황색4호, 황색5호

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

■ **성상** 황색의 장방형 필름 코팅정

■ **효능 · 효과**

다음 증상을 수반하는 계절성 및 다년성 알레르기 비염의 완화: 코막힘, 재채기, 콧물, 눈 및 코의 소양증

■ **용법 · 용량**

1. 12세 이상의 소아와 성인

식사와 관계없이 1회 1정씩 1일 2회(아침, 저녁) 복용합니다.

이 약은 씹거나 부수어서 복용하지 말고 그대로 삼켜서 복용합니다.

2. 이 약은 2~3주 이상 복용하지 않도록 합니다.

3. 신기능 저하 환자 및 간기능 저하 환자의 경우 감량하여 1회 1정씩 1일 1회 복용합니다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 이 약 또는 ephedrine 또는 piperazine류에 과민증이 있는 환자

(2) 심각한 고혈압 또는 심각한 관상동맥질환 환자

(3) MAO(monoamine oxidase) 저해제를 투여 중이거나 2주 이내에 투여한 환자

(4) 안내(눈속)에 들어가되어 있거나 녹내장, 녹저류(소변이 고임)가 있는 환자

(5) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유 전적인 문제가 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) MAO(monoamine oxidase)저해제(억제제), β 2-교감신경 효능 억제약은 교감신경양 작용을 증가 시킵니다.

MAO저해제(억제제)의 긴 작용시간 때문에 MAO저해제(억제제) 투여 최소 15일 후 이 약물을 복용합니다.

(2) 교감신경양 아민은 methyldopa, guanethidine, reserpine의 항고혈압 효과를 감소시킵니다.

(3) 수도에페드린을 디기탈리스와 병용 투여할 때 전위성 심박 조율기의 활성이 증가될 수 있습니다.

(4) 수도에페드린은 제산제에 의해 흡수속도가 증가되는 반면, 카올린에 의해 흡수속도가 감소됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

(1) 운전이나 위험한 기계를 조작하는 경우 주의를 요합니다.

(2) 이 약에 함유되어 있는 세티리진과 수도에페드린은 모두로 분비되므로 이 약을 복용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안됩니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것

(1) 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 고혈압, 빈맥, 부정맥, 허혈성 심질환, 신장 및 간기능 부전환자, 노인

(2) 교감신경양 약물(비총혈 제거약, 식욕억제제, amphetamine등의 정신흥분제), 삼환계 항우울약, 디기탈리스 제제를 투여 받는 환자

(3) 기타 다른 중추신경 흥분약을 투여받는 환자

(4) 알코올 또는 기타 중추신경억제제를 투여받는 환자

(5) 임신부나 임신하고 있을 가능성이 있는 사람 또는 수유부 : 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

(6) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

(7) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 삼당 시 가능한 한 이

첨부분서를 소지하십시오.

(1) 구갈, 두통, 불면, 수면, 무기력, 빈맥, 신경과민증, 어지러움증, 현훈, 오심

(2) 공포, 흥분, 긴장, 불안, 진전, 호흡곤란, 환각, 경련, 중추신경억제, 부정맥, 저혈압이 있는 심혈관계 허탈

(3) 피부반응, 혈관부종 등의 과민반응

(4) 본제를 복용한 후에 두 증상이 개선이 없는 경우

6. 과량 투여시의 처치

과량 투여 시 빈맥, 부정맥, 고혈압, 중추신경억제효과(진정, 무호흡, 무의식, 청색증, 심혈관계 허탈증) 또는 자극효과(불면, 환각, 진전, 경련)가 나타날 수 있습니다. 즉시 병원으로 옮기고 대증적인 방법을 취하도록 합니다.

위세척을 실시하고 고혈압은 α -억제약으로 조절하고 빈맥(빠른맥)은 β -억제약으로 조절한다.

경련이 나타나면 디아제팜을 정맥투여합니다.

7. 저장상의 주의사항 - 기밀용기, 상온(15~25°C)에 보관하고 다음 사항을 주의하십시오.

가. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

나. 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ **저장방법 · 사용기간** 기밀용기, 상온(15~25°C)보관, 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** 자사기준

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된 K.G.M.의약품입니다. 만의 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자2014.02.17