

바지씨 질정

Brand of Ascorbic acid

분류번호 : 255

【원료약품 및 그 분량】

1정(1000mg) 중

아스코르빈산(유럽약전) 250밀리그램

【성 상】

백색 - 밝은 황색의 장방형 질정제

【효능·효과】

경증 및 중증도의 만성 또는 재발성질염(세균성 질염, 비특이성 질염);

손상된 질내 세균총의 정상화

【용법·용량】

1일 1회 1정 6일간 질내 삽입

중증 또는 임신시에 1주일 이상 사용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민증이 있는 환자
- 2) 생식기 내의 진균 감염 : 산성 환경에서 진균이 빠르게 증식하기 때문에 오히려 증상을 심각하게 할 수 있다.

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 살리실산염은 본제의 효과를 저하시킬 수 있다.
- 2) 에스트로겐은 비타민 C의 생체 이용률을 향상시킨다.
- 3) 본 제로 인해 항응고제(혈액 응고를 방해하는 제제)의 효과가 저해된다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 질내 세균총이 정상화된 후 간혹 효모가 더 빠르게 증식한 결과로 나타나는 증후성 진균감염에 의해 질 부위가 따끔거리거나 가려울 수 있다.
- 2) 본 제제의 성분 중 하나에 대한 과민증이 나타날 수 있다. 이 경우 투약을 중단한다.

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 임신중이거나 수유기에도 투약할 수 있다.
- 2) 동물 실험에서 많은 양을 투약해도 2세에서 아무 문제도 발견되지 않았다.
- 3) 과량투여로 인한 증상은 알려지지 않았다. 단, 적게 사용하였거나 투약을 한 차례 잊은 경우 부족한 만큼 보충해서 투약한다.
- 4) 비타민 C가 소변 내의 효소성 포도당 측정치와 혈청 트랜스아미나제 측정치, 락트산탈수소효소 측정치, 혈청 빌리루빈 측정치에 영향을 준다.
- 5) 일시적인 출혈이나 월경으로 인한 출혈 때문에 이 약의 투약을 중단할 필요는 없다.
- 6) 기타 원발성 질환이나 전신성 전염병은 이 약의 투약 금기사항이 아니다. 오히려 스트레스 상황에서는 체내 비타민 C 필요량이 증가하기 때문에 이 약을 추가로 투약하는 것이 바람직할 수도 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 서늘하고 건조한 곳에 보관한다.
- 2) 보관을 잘못하면 질정이 암갈색으로 변색될 수 있다.
- 3) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 4) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1-30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 6정

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

※의약품을 사용하기전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오.

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

수입·판매원
 **명문제약주식회사**
경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1
www.mmpharm.co.kr

〈설명서작성년월 : 03 . 08.〉
〈설명서개정년월 : 07 . 12.〉
〈M02〉

계약제조원
 **TAURUS PHARMA GmbH**
Berner Str. 40-42 60437 Frankfurt, Germany

위탁제조원
ARTESAN PHARMA GmbH & coKG
Wendlandstr. 1, 29439 Lüchow, Germany