일 반 의 약 품
222 : 진해거담제

기침 · 가래 · 천식에

바로코푸 캡슐

바로코푸캡슐은 진해제, 항히스타민제, 거담제 등을 복합 처방한 제제로서 기침, 가래 및 천식을 신속하게 완화시켜 줍니다. 또한 조절중추에 직접 작용하여 기침을 억제시키므로 복용 시 나른함과 같은 진정작용이 나타나지 않습니다. 호흡기 내 축적된 분비물의 점도를 낮추고 과도한 점액분비를 억제함으로써 가래를 신속히 제거하여 주며 기관지 경련 억제, 기관지근 이완 작용으로 기침을 효과적으로 완화시켜줍니다.

【성분 · 함량】 1캡슐 중

브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	15.0mg
염산노스카핀(약전)	20.0mg
염산트리메토퀴놀(약전)	2.0mg
구아이페네신(약전)	75.0mg
d-말레인산클로르페니라민(약전)	2.0mg

【성상】 백색의 분말이 든 상부 황녹색 하부 미황색의 캡슐제

【효능 · 효과】 기침, 가래, 천식

【용법 · 용량】 성인 1회 1캡슐씩 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자
   2) 약으로 알레르기증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
   3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열 환자, 허약자
   4) 심장애 및 고혈압 환자, 고령자
   5) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자
   6) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3. 부작용
   1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
   2) 이 약을 투여함으로써 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.
5. 상호작용
   다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여하지 마십시오.
6. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10, 10×10캡슐

※ 유통도중 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

설명서 작성년월일 20040730

민족의 슬기와 긍지로 인류의 건강을 위하여
신풍제약주식회사
경기도 안산시 단원구 목내동 434-4 · TEL)031-491-6191~2