

엘도틴 캡슐

(에르도스테인)

【원료약품 및 분량】 1캡슐 중

주성분 : 에르도스테인 (별규) 300mg

첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 5호, 청색 1호

【성상】

백색의 분말이 들어있는 상부 초록색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능·효과】

급만성 호흡기 질환의 점액 용해 및 거담

【용법·용량】

1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

【사용상 주의사항】

- 다음 환자에게는 투여하지 말 것
 - 동성분에 과민증이 있는 환자
 - 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자
- 이상반응
 - 사용량(1200mg/일) 보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났다.
 - 국내 시판후 조사결과 (조사종례수 : 캡슐제 3,303명 시럽제791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 땀통함, 발진
- 상호작용
항생제, 기관지확장제(테오필린, β_2 -효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.
- 임부·수유부에 대한 투여
임신중, 수유부예의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2009년 4월 27일) 이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr 이나 ezdrug.kfda.go.kr 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 참조

※ 고객센터상설 : 080-221-2000(수신자부담) 작성년월일 2009. 4. 27

제조발매원



이연제약주식회사

본사: 서울·용산구 동빙고동 38-6
공장: 충북 진천군 덕산면 한천리 27-27
TEL. (02)793-5557,5374