

[성분 · 함량] 이 약 1캡슐(총중량 365mg) 중

아세트아미노펜(약전)	200mg
염산클로페라스틴(JP)	8mg
말레인산클로르페니라민(약전)	1.25mg
d-염산메칠에페드린(약전)	8.75mg
염화리소짐(KPC)	10mg(역가)
무수카페인(약전)	20mg
질산치아민(약전)	1mg
리보플라빈(약전)	2mg
감초건조엑스(5→1)(별규)	18mg
길경건조엑스(10→1)(별규)	7mg

[성상] 이 약은 황색의 분말상 과립을 함유하는 하부 백색, 상부 노랑색의 경질캡슐제입니다.

[효능 · 효과] 감기의 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법 · 용량] 성인 : 1회 2캡슐, 1일 3회, 식후 30분에 복용합니다

11세이상~15세 미만 : 1회 1½캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

8세이상~11세 미만 : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선 질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 8) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 9) 부종이 있는 환자
- 10) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 부작용

-피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오

- 1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오 · 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오
- 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오

- 1) 본제의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 · 약사와 상의하십시오
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오
- 3) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오
- 4) 장기 연용하지 마십시오
- 5) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨 혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

Ⓡ 등록상표

[포장단위] 10캡슐


■ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

■ 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 판텍 캡슐은 어린이의 의약품 오용으로 인한 약물 사고를 방지하기 위해 어린이 보호용 안전포장 (Children Resistance: CR포장)을 적용하였으며, 반드시 개봉방법을 숙지하신 후 복용하시기 바랍니다.



① 필름을 화살표 방향으로 벗기십시오.



② 윗부분을 누르면 캡슐이 나옵니다.

[최신정보 확인 방법]

이 첨부문서 작성일자이후 변경된 내용은 홈페이지(www.donga.co.kr)에서 확인할 수 있습니다

※사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화 : 080-920-2002(수신자부담)]

작성년월일 : 2006. 7

개정년월일 : 2006. 10



東亞製藥



동이제약

본사 : 서울특별시 동대문구 용두동 252
공장 : 충청남도 천안시 차암동 404

PTS-6K002