복잡한 감기, 화콜로 통일 —

화콜®포르테

캡슐

생약 성분이 강화된 종합감기약

코감기
기침감기
몸살감기

일반의약품

의약품 분류번호	114 해열·진통 소염제

■ 원료약품의 분량

1캡슐(422.92mg)중

아세트아미노펜(K.P.)	200.0mg
말레인산클로르페니라민(K.P.)	1.25mg
히벤즈산티페피딘(K.P.)	12.5mg
dl-염산메칠에페드린(K.P.)	7.5mg
구아이페네신(U.S.P.)	10.0mg
염화리소짐(식품의약품안전청고시 제1998-127호)	10.0mg(역가)
무수카페인(K.P.)	10.0mg
질산치아민(K.P.)	4.0mg
리보플라빈(K.P.)	2.0mg
90% 아스코르빈산(별규)	16.67mg
(아스코르빈산으로서	15.0mg)
감초엑스(5→1)(별규)	21.0mg
길경엑스(10→1)(별규)	9.0mg
계피엑스(별규)	5.0mg

■ 성 상

황색의 가루가 들어있는 상부 농황색, 하부 농황색의 경질캡슐제

■ 효능·효과

감기의 제증상(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■ 용법·용량

성인은 1회 2캡슐, 어린이(8~14세)는 1회 1캡슐을 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.
   1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종[후두, 눈꺼풀, 입술 등])을 일으킨 적이 있는 사람
   2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의하십시오.
   1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
   2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
   3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이

4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.
1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오
4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.
알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.
1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오
(1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가와지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
(2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
(3) 천식이 나타난 경우
2) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오
3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
4) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오
5) 장기 연용하지 마십시오

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오
2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오
3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오

7. 부작용
1) 피부
스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의하십시오.
또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

■ 포 장 단 위

10Caps. 1,000Caps.

■ 저 장 방 법

기밀용기, 실온(1-30℃)보관

■ 교환 및 제품문의

이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질 · 부패 또는 파손된 제품 등은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다. 또한 제품에 관한 문의사항이 있으시면 연락주십시오.
연락처 : 마케팅팀 (02)840-6708, 고객보호팀(수신자요금부담) : 080-587-8531

첨부문서 작성년월일 : 2004. 8. 20이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (http://www.cwp.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

국민건강을 선도하는
주식회사 중외제약
경기도 화성시 태안읍 안녕리 146-141
http://www.cwp.co.kr