

올판토정

삼성제약에서 만든 올판토-에프정은 해열진통제인 아세트아미노펜, 기관지확장제인 염산슈도페데린, 진해거담제인 브롬화수소산덱스트로메토르판, 항히스타민제인 말레인산클로르페니라민이 함유되어 오한, 발열, 기침, 몸살, 코감기 증상, 인후통 등의 감기의 모든 증상에 효과적입니다.

[원료약품의 분량] 1정 중

아세트아미노펜(KP).....	325mg
염산슈도페데린(USP).....	30mg
브롬화수소산덱스트로메토르판(USP).....	15mg
말레인산클로르페니라민(USP).....	2mg
첨가제(타르색소): 황색4호, 청색1호	

[성상] 연두색의 장방형 무색 필름코팅정제

[효능·효과] 감기의 증상상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량]

다음 1회의 용량을 1일 3회 식후 30분에 복용하는 것으로 합니다.

1회 용량 : 15세 이상	: 1정
11세 이상 ~ 15세 미만	: 2/3정
7세 이상 ~ 11세 미만	: 1/2정

[사용상의 주의사항]

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색4호(타르타린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의한 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

5. 복용할 때 다음 사항에 주의하십시오.

- 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 여러 사람에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시키십시오.
- 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.
- 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
· 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고 수족이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
· 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
· 천식이 나타난 경우
- 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소 되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.

6. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항에 주의하십시오.

- 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 장기 연용하지 마십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 곳에 보관하십시오.
- 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 12정

[저장방법 및 사용기간] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 KGMP(우수의약품 제조관리 기준)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.

※ 소비자상담실 : 080-777-8285 / www.sspharm.co.kr

첨부문서 최종개정연월일 : 2009.12.01



제조발매원

삼성제약공업주식회사

사 : 서울특별시 강남구 동복동 614-4

공 : 경기도 화성시 향남읍 상신리 905-1

1929년 창립