



비타민 B·C + 항산화성분

베콤씨에이스정

분류번호 316 (혼합비타민제)

개요 및 특징

베콤씨에이스정은 스트레스, 과중한 업무, 과음, 흡연, 불규칙한 생활습관 등으로 인해 건강을 해치기 쉬운 현대인에게 주로 나타나는 육체피로, 눈의 피로, 신경통, 관절통(요통, 건통) 등의 증상을 효과적으로 개선할 목적으로 비타민 B군, C, E 및 인체에 부족하기 쉬운 필수미네랄인 셀레늄, 아연, 우르소데옥시콜산이 이상적으로 배합된 비타민 제제입니다.

1. 에너지생산

우리 몸이 정상적으로 활기차게 활동하려면 충분한 에너지가 생성되어 근육, 뇌를 비롯한 여러 장기가 활동할 수 있어야 합니다. 섭취한 열량에 비해 에너지 생산에 필수적인 비타민, 미네랄의 보급이 식생활의 불균형 등으로 부족할 경우 에너지 생산이 원활하지 않아 무기력해지고 피로해질 수 있습니다. 베콤씨에이스는 에너지 생산에 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.



■ 육체피로와 베콤씨에이스정-

베콤씨에이스는 신경과 근육에 쌓인 피로소(젖산)를 분해, 배설시켜 피로를 없애주고 에너지 생성을 원활히 하여 건강에 활력을 높여줍니다.



■신경통, 건통, 요통과 베콤씨에이스정-

비타민 B₁, B₆, B₁₂는 신경계 비타민으로서 상한 신경의 재생을 도와주며 신경·근육의 대사를 촉진하고 운동을 활발하게 해주므로 신경통, 건통, 요통 등에 효과를 발휘합니다.



■병중·병후의 체력저하와 베콤씨에이스정-

병중·병후나 에너지의 소비량이 많은 경우에는 비타민제의 보급이 필요합니다. 수용성비타민인 비타민 B군 및 비타민 C는 장에서 잘 흡수되어 에너지를 필요로 하는 우리 몸의 구성구성에 공급이 됩니다.

2. 항산화작용

인간은 호흡으로 들이마신 산소를 가지고 매일 먹은 음식을 산화시켜 에너지를 만들어 내야만 생존할 수 있는데 이 에너지를 만드는 과정에 불가피하게 우리 몸에 손상을 주는 유독한 물질인 산소찌꺼기가 만들어지게 됩니다. 이것을 유리기(Free Radical)라고 하며 이 유리기의 활동을 억제하는 것을 항산화작용이라고 합니다. 이 유리기는 인체의 정상세포를 손상시켜 각종 질병이나 노화를 일으키는 원인물질로 알려져 있습니다.



■유리기의 억제와 베콤씨에이스정-

우리 몸에는 유리기를 제거할 수 있는 방어기전이 있지만 나이가 들수록 약해지게 됩니다. 베콤씨에이스는 대표적인 항산화성분인 비타민C, 비타민E, 셀레늄(Se) 및 아연(Zn)을 보강해 주어 인체에 유해한 유리기의 공격으로부터 우리몸을 보호해 줍니다.

성분·함량 1정 중

아스코르브산 97% 과립(비타민 C)(별규) --- 618.56mg (아스코르브산으로서 600mg)	시아노코발라민 1% (비타민 B ₁₂)(별규) ---- 0.5mg (시아노코발라민으로서 5μg)
티아민질산염(비타민 B ₁)(KP) ----- 15.0mg	비오틴 1% (별규)-----4.5mg (비오틴으로서 45μg)
피리독신염산염 97% 과립(비타민 B ₆)(별규) --- 5.15mg (피리독신염산염으로서 5mg)	우르소데옥시콜산(KP)----- 10.0mg
리보플라빈(비타민 B ₂)(KP) ----- 10mg	황산아연일수화물(USP) ----- 22.0mg (아연으로서 8mg)
토코페롤아세테이트 50% (비타민 E)(KPC)---50.0mg	셀레늄함유건조효모(KPC)----- 37.1mg (셀레늄으로서 20μg)
폴산(KP) ----- 0.2mg	
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 2호, 황색 203호	

성상 적색의 장방향 제피정

앞 면	뒷 면	측 면

효능·효과

- 다음 경우의 비타민B₁, B₂, B₆, C, E의 보급: 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 노년기
- 눈의 피로, 각기
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
- 잇몸출혈·비출혈의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 관절통(요통, 건통 등), 근육통, 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
- 아연(Zn)의 보급


용법·용량 12세 이상 및 성인 : 1회1정, 1일2회 복용합니다.




※ 그림과 같이 정제포장의 알루미늄 윗부분을 화살표방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다.
이 때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

사용상의 주의사항


- 다음 환자는 복용하지 마십시오.**
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 12개월 미만의 영아
- 다음 환자는 신중히 복용하십시오**(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과산화노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임신한 여성, 수유부
 - 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 5) 신장에 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 위장관 질환
- 부작용**
 - 1) 이 약 복용에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐 부어오름
 - 2) 이 약의 복용에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 오랜 기간 많은 용량을 복용할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 5) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 오랜기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 6) 염산이 부족한 환자가 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 복용할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 7) 많은 양의 복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈성심부전, 부어오름 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의**
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 복용합니다.
 - 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킵니다.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 상호작용**
 - 1) 할랄도스테론제, 트리암테넨과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 함께 복용하지 않습니다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피합니다.
- 임상검사치에의 영향**
 - 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항**



1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.



3) 잘못된 사용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30 ℃)보관

사용기한 외부 포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다.
예) 제조번호 0001, 사용기한 2013년 1월 6일인 경우 → “0001 / 130106” 로 표시

포장단위 100정

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 정부의 “소비자분쟁해결기준”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여드립니다.

※ 최근 개정된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안개정년월일 : 2010. 10. 14
제품의 사용기한은외부포장에 표기



제조판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 대방동 49-6
공장 : 충북 청원군 오창읍 양청리 807-1

www.yuhan.co.kr
대표전화 : 02-828-0181
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자요금부담)