

생약성분과 비타민 B군이 복합 처방된 간장질환 개선제

메가두스

(Megaduus Soft Cap.)

성분·함량 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스 (DAB)	100.0mg
(실리빈으로서 30.0mg, 실리마린으로서 70.0mg)	
염산치아민 (KP)	4.0mg
리보플라빈 (KP)	4.0mg
염산피리독신 (KP)	4.0mg
니코틴산아미드 (KP)	12.0mg
판토텐산칼슘 (KP)	8.0mg
시아노코발라민0.1% (KPC)	1.2mg
(시아노코발라민으로서 1.2ug)	
파라옥시안식향산메칠(KP)	0.48mg
파라옥시안식향산프로필(KP)	0.24mg

[착색제]

식약청인정타르색소(적색 40호, 황색 203호, 청색 1호)

- 성상 : 황갈색의 유상 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

효능·효과

다음 질환의 보조치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

용법·용량

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 복용합니다. 치료후 복용량을 1일 1~2캡슐로 줄입니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험 연구는 되어 있지 않습니다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 설사
 - 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지키십시오.
 - 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위 150, 300캡슐

- ※ 만약, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
본 제품에 이상이 있을 경우 재정경제부 고시에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 본 제품에 대한 의문사항은 소비자상담실 수신자 부담전화 080-708-8088로 문의하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2007년 10월 1일) 이후 변경된 내용은 080-708-8088에서 확인할 수 있습니다.

011007



경기도 안산시 단원구 신길동 1122-3
www.boryung.co.kr