

간질환 · 지방간에

실리마

연질캡슐

SILYMA Soft Cap.

일반의약품

분류번호:391

간은 인체 내에서 가장 큰 장기로서 단백질, 지방, 알코올을 비롯한 각종 물질의 대사, 해독 등 생명 유지에 필수적인 중요한 역할을 합니다.

실리마 연질캡슐은 Cardus marianus라는 생약에서 추출한 유효성분인 실리마린과 신진대사를 활성화하는 비타민B군으로 처방되어 만성간질환, 지방간, 간경변, 중독성간질환의 치료 보조제로 쓰입니다.

실리마 연질캡슐은 간에 해를 입히는 독성물질을 해독시켜 간장을 보호하고 간세포막을 안정화시키며, 간장조직을 재생시켜줍니다. 또한 비타민을 보강하여 간대사를 원활하게 하여 음주나 간기능이상으로 오는 피로, 무력감에도 좋은 새로운 간장약입니다.

● 원료약품의 분량 : 1캡슐중

카르두스마리아누스엑스(KPC).....	100mg
(실리빈으로서 30mg, 실리마린으로서 70mg)	
염산치아민(약전).....	4mg
리보플라빈(약전).....	4mg
염산피리독신(약전).....	4mg
니코틴산아미드(약전).....	12mg
판토텐산칼슘(약전).....	8mg
0.1%시아노코발라민(KPC).....	1.2mg
(시아노코발라민으로서 1.2 μ g)	

● 성상


황갈색의 유상 내용물이 든 일면 황록색, 일면 암록색의 장방형 연질캡슐제

● 효능·효과

· 다음 질환의 치료보조 : 만성간질환, 지방간, 간경변, 중독성간질환

● 용법·용량

성인 1회 2캡슐, 1일 3회, 가벼운 질환에는 1회 1캡슐, 1일 3회 복용
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.



경남제약주식회사

충남 아산시 신창면 읍내리 80-24

마약없는 우리사회 건강가득 행복가득
약좋다고 남용말고 약모르고 오용말자

첨부분서 작성일자
2005. 10. 20

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
이 약은 황색4호(타르트트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2. 복용시 다음 사항에 주의할 것
 - 1) 정해진 용법 용량을 지킬 것
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것
3. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의 할 것
 - 1) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것
4. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 (습기가 적고) 서늘한 곳에 (밀전하여) 보관할 것
 - 3) 오염을 피하고, 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

● 사용기간 : 제조일로부터 24개월

● 저장방법 : 차광기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

● 포장단위 : 100, 200캡슐

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 학술부로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병 · 의원 약국 및 도매상을 통하여 교환해 드리며, 재정경제부 고시 "소비자 피해 보상 규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
(문의 전화 : 031-260-9161, 학술부)

【최신 정보 확인 방법】

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.kyungnampharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.