

육체피로, 말초혈행장애, 갱년기 증상 개선에

셀타골드에스 연질캡슐

SELTA GOLD - S Soft Cap.

일반의약품
분류번호:316

산소는 생명유지에 반드시 필요하나 체내 산화환원대사, 화학약품, 각종 공해 물질에 의해 반응성이 매우 큰 활성산소가 되면 생체세포를 공격하여 세포막의 변화를 일으키는 등 각종 질병 및 성인병의 주범이 됩니다. 호흡으로 인체에 들어온 산소중 약 2%는 활성화된 유리기의 형태로 되어 유해산소로 존재합니다. 정상인에서 이 유해산소는 superoxide dismutase라는 효소의 작용으로 제거되는데 이 과정에서 셀레늄 등의 미네랄과 베타카로틴, 토코페롤, 아스코르빈산과 같은 항산화성 비타민이 요구됩니다.

셀타골드에스연질캡슐은 수용성 항산화제인 비타민C와 지용성 항산화제인 비타민E 및 베타카로틴, 항산화성 미네랄인 셀레늄이 이상적으로 배합되어 있어 각 성분간의 상승작용을 통해 유리기가 DNA를 공격하는 것과 세포막 구조를 파괴시키는 것을 효과적으로 방어하여 육체피로, 말초혈행장애 및 어깨, 목결림, 수족저림·수족냉증 등 갱년기 증상을 효과적으로 개선합니다.

● 원료약품의 분량 : 1캡슐중

셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 25 μ g)(식약청고시 제98-127호).....	46.3mg
베타카로틴30%현탁액(베타카로틴으로서 7.5mg)(식약청고시 제98-127호).....	25.0mg
초산토코페롤(비타민E로서 200IU)(약전).....	200.0mg
아스코르빈산(약전).....	250.0mg
리보플라빈(약전).....	5.0mg
엽산피리독신(약전).....	4.0mg
0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 1 μ g)(식약청고시 제98-127호).....	1.0mg
니코틴산아미드(약전).....	10.0mg
질산치아민(약전).....	6.0mg

● 성 상 : 적갈색의 유상내용물을 함유한 암적색의 장방형 연질캡슐

● 효능·효과 : 다음의 경우 비타민A, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증
- 임신·수유기 - 병중·병후의 체력저하시 - 노년기 - 잇몸출혈·비출혈 예방
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화 - 육체피로

● 용법·용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

● 사용상의 주의사항

1. 경고

임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU.이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU./일 이상 투여하지 않는다.(비타민A결핍증 환자는 제외)

2. 다음 환자는 투여하지 말 것

- 1)이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2)12개월 미만의 영아

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1)의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2)과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3)임부, 수유부
- 4)심장·순환계기능 장애 환자
- 5)신장애 환자



경남제약주식회사

서울시 용산구 한강로3가 40-876
충남 아산시 신창면 읍내리 80-24

6)저단백혈증 환자

7)이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4.부작용

1)이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친피부, 통증성 관절 부종, 복부팽만감, 위부불쾌감, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 식욕 부진, 묽은변, 설사, 변비, 발진, 발적이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

2)이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.

3)에스트로젠을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4)장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5)피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

6)엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. .

7)고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance Impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산 혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

8)대량투여에 의해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.

5.일반적 주의

1)정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2)1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.

3)이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조 요법의 용량은 1일 5,000I.U.이상을 넘지 않도록 한다.

6.상호작용

1)항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.

2)이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.

가)인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제

나)레보도파

3)녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7.임부·수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월동안 비타민A를 10,000I.U./일 이상 섭취한 여성으로 부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학 조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

8.임상검사치에의 영향

1)각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

2)요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

9.저장상의 주의사항

1)어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2)직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3)오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 않는다.

● **사용기간** : 제조일로부터 24개월

● **저장방법** : 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

● **포장단위** : 100, 200캡슐

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 학술부로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 병·의원 약국 및 도매상을 통하여 교환해 드리며, 재정 경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다. (문의 전화 : 02-798-9387, 학술부)