

어린이 보호용
안/전/포/장 도입!

양·한방 복합 기침감기약

「일반의약품」

하벤코프-에이

캡슐

기침, 가래, 인후통 등의 증상이 수반되는 기침감기는 바이러스에 의한 상기도 감염에 의한 것으로 계절이나 기후가 변할 때 흔히 잘 걸리게 되고 방치할 경우 심해져서 폐렴 등의 2차 합병증으로 악화될 수 있습니다.

하벤코프-에이는 기침 및 가래에 잘 듣는 4가지 양약성분과, 예로부터 거담제로 널리 쓰여온 길경과 감초를 포함하여 기침, 가래, 인후통 등과 같은 기침감기 증상에 뛰어난 효과를 나타냅니다. 또한 해열·진통성분도 들어 있어 두통, 오한, 발열 등의 증상완화에도 신속한 효과를 나타냅니다.

■ 원료약품의 분량 : 이 약 1캡슐 중

아세트아미노펜(약전)	200mg
구아이페네신(약전)	41.6mg
브롬화수소산텍스트로메토르판(약전)	8mg
dl-염산메칠에페드린(약전)	12.5mg
염화리소짐(식약청고시 제1998-127호)	10mg(역가)
길경50%에탄올건조엑스(10→1)(별규)	15mg
감초건조엑스(5→1)(별규)	25mg

■ 성상 : 백색 및 갈색의 분말이 든 상·하부 담청색의 경질 캡슐

■ 효능·효과 : 감기의 제증상(기침, 가래, 인후통, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■ 용법·용량 : 성인 : 1회 2캡슐, 어린이(8~14세) : 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 이상반응

- 1) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의합니다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받습니다.
- 2) 유아에서 이 약에 함유된 염화리소짐을 처음으로 복용했을 때, 속(아나필락시)이 나타났다는 보고가 있으므로 복용전에 의사 또는 약사와 상의합니다.

4. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장 또는 신장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 8) 부종이 있는 환자

5. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시키십시오.
- 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋습니다.

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담하십시오.
 - 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
 - 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.
7. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의하십시오.
- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 2) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 3) 장기연용하지 마십시오.
 - 4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 있는 경우
 - 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
 - 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
 - 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
 - 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)


■ **포장단위** : 10캡슐

■ **첨부분서 작성일** : 2006년 10월 26일

■ **소비자 상담실** : (02)529-6100~9 (교환)312

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

6-10-26



※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 ※ 사용전에 첨부분서를 꼭 읽으십시오.
 ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 회사로 문의하십시오.
 ※ 회사 홈페이지 주소 : <http://www.nicepharma.com>
 ※ 첨부분서 작성일 이후에 변경된 허가사항은 소비자 상담실 또는 회사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.



고려제약주식회사

본사 : 서울특별시 강남구 도곡동 423-2 ☎ (02) 529-6100~9
 공장 : 경기도 이천시 신둔면 수광리 486 ☎ (031) 634-7100~2