

종합 감기약

판코엔 캡슐

오한 · 발열/기침/콧물/인후통

일반의약품 10캡슐

- 원료약품 및 분량 : 1캡슐 중
- 아세트아미노펜(K.P) 300mg
 - 덱스트로메토르판볼록수소산염수화물(K.P) 15mg
 - dl-메틸에페드린염산염(K.P) 12.5mg

- 구아이페네신(K.P) 65.1mg
- 카페인무수물(K.P) 30mg
- 말레인산카르비녹산염(U.S.P) 2.5mg
- 티아민질산염(K.P) 8.33mg
- 리보플라빈(K.P) 4mg

- 성상
- 황색의 분말이 충전된 상 · 하부 녹색의 경질캡슐
- 효능 · 효과 : 감기의 증상상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

■ 사용상의 주의사항

1. 경도, 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것.

1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기 성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유 · 유아 및 어린이(14세 이하) 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자 6) 녹내장에: 눈의 통증, 눈의 침침함 등이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람 7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람, 수유부 8) 의사 또는 치료의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 복용시 주의사항

1) 용법 · 용량을 잘 지켜 것. 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것 : 진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에는 부족한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다. 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함과 함께 안색이 창백해지고; 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 ② 고열을 수반하여 발진, 발적, 화상

등 양 수로 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③ 천식이 나타난 경우 6) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 한자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것. 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 4) 장기 연용하지 말 것.

6. 보관 및 취급상의 주의

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kida.go.kr>) → 정보마당, → 의약품등 정보 를 참조하세요

※ 소비자상담실 : 02-579-6262 ※ 홈페이지 : www.pharvisbio.co.kr

본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사 용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : PANC 2009.01.23

분류번호:114

8 806836 016114

- 용법 · 용량 : 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 30분에 복용한다.
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월

(주)한국파비스바이오텍

경기도 안산시 단원구 록대동 456-3

