

기침 · 가래

분류번호:222

일반의약품

KGMP적격업체

해소코푸캡슐

감기 등 호흡기관에 이상이 생기면 기침, 가래, 만성 기관지 질환 등 점점 심한 호흡기 질환으로 진전될 수 있습니다. 그 원인은 갑작스런 기후변화, 실내 공기오염, 대기오염, 담배연기, 실내 내장재, 진드기, 곰팡이 등 여러가지 요인이 있습니다. 이러한 호흡기 질환은 일상생활에 많은 지장을 주므로 증세가 더 악화되어 가기 전에 속히 치료하여야 합니다.

"해소코푸캡슐"은 기침의 감수성 저하와 기도점막 선모상피 운동항진에 의한 진해거담 작용이 인산코페인과 같은 정도의 약리작용 성분이 함유되어 있으며 이에 완화된 강심이뇨, 기관지확장, 항알러지작용 성분이 복합 처방된 새로운 기침, 가래에 잘 듣는 약입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

히벤즈산티페피딘(약전)	12.5mg
염산트리메토퀴놀(약전)	0.5mg
디프로필린(B.P)	25mg
d-말레인산클로르페니라민(약전)	1mg
무수카페인(약전)	25mg

【성 상】 백색내지 미황색의 내용물이 든 상 · 하 등적색의 경질 캡슐제

【효능 · 효과】 기침, 가래

【용법 · 용량】 성인(15세 이상)은 1회 2캡슐, 어린이(8~14세)는 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 환자.
- 2) 약으로 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자.
- 3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 환자, 고열환자, 허약자, 간질환자
- 4) 심장애 및 고혈압환자, 고령자
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6) 녹내장(눈의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배뇨장애 환자.
- 7) 다른 약물을 투여받고 있는 환자.

2. 이상반응

- 1) 이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움, 동계, 배뇨곤란, 구갈 등이 나타날 경우에는 투약을 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 2) 이 약을 투여하는 동안 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 소아에게 투여한 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여한다.
- 3) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4. 상호작용

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등과 병용투여하지 않는다.

5. 소아에 대한 투여

7세 이하의 영·유아에는 시럽제를 투여한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 장소에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【포장단위】 10캡슐, 20캡슐, 1000캡슐

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하고 자세한 내용은 설명서 참조.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

문서작성년월일 : 2004년 3월 12일

● 최신의 정보 확인방법 : 변경된 내용은 학술부(031-443-3922~3)에서 확인할 수 있음.



제조발매원
크라운제약(주)
경기도 안양시 만안구 안양7동 218-7
학술부 (031)443-3922~3, 02)754-4271