

아티오닐정

S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염

KGMP지정업소

전문의약품
분류번호 : 399

【성분·함량】 1정(626.4mg) 중
S-아데노실-L-메티오닌황산토실산염(KPC) 384mg
(S-아데노실-L-메티오닌으로서 200mg)
첨가제(타르색소) : 황색203호

【성상】
미황색의 원형 장용성 필름코팅 정제

【효능·효과】
활동성 퇴행성 관절증, 우울증

【용법·용량】
1. 활동성 퇴행성 관절증
○ 성인 : S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 200mg 1일 2회 식전 30분에 경구투여하며, 이 약으로서 1회 400mg 1일 3회까지 증량하여 투여할 수 있다.
2. 우울증
○ 성인
- 개시요법: S-아데노실-L-메티오닌으로서 1회 400mg 1일 2~3회 15~30일 간 경구투여 한다.
- 유지요법: 1회 200mg 1일 2~3회 경구투여 한다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약에 과민반응 환자
2) 정신분열증 환자
3) 양극성장애 환자
4) 소아
5) 임부 및 수유부
2. 이상반응
1) 과민반응 : 안면부종, 혀와 후두 내부의 경직, 천식성 호흡곤란, 빈맥(빠른맥), 급격한 혈압강하, 속이 나타날 수 있다.
2) 소화기계 : 때때로 위장관 불편감, 구역, 구토, 경미한 복부통증, 위장관 출혈, 드물게 변비, 복부팽만감, 소화불량이나 타날 수 있다.
3) 피부 : 발진, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있다.
4) 기타 : 때때로 수면장애, 드물게 구강건조증, 두통, 피로가 나타날 수 있다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신 중의 투여에 대한 임상경험이 충분하지 않으므로 투여하지 않는다.
2) 모유 중으로의 이행여부가 알려져 있지 않으므로 투여하지 않는다.
4. 보관 및 취급상의 주의사항
수습이나 보관도중 용기에 금이 가거나 장기간 열에 노출되어 변색이 된 것은 교환하여 사용하는 것이 바람직하다.

【저장방법 및 사용기간】
기밀 용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】
100정

【제품 및 교환】
본 제품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 만약 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품이 발견될 경우 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하여야 합니다.
※ 다른 용기에 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않음으로 주의하시기 바랍니다.
※ 유효기한 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 참고사항 : 인습성이 강하므로 건조한 곳에 보관하며, AluAlu 상태로 조제하십시오.

※ 본 설명서 개정년월일 이후의 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(www.yypharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 제품관련 문의사항은 (주)유영제약 소비자상담실(수신자 부담전화 080-808-6114)로 문의바랍니다.

설명서 개정년월일 : 2014.08.27
PR1981408

Y
YOORYOUNG PHARMACEUTICAL
유영제약

제조판매자 (주)유영제약
충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33