

슬림비정

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

질산치아민(약전)	1.5mg
리보플라빈(약전)	1.7mg
니코틴산아미드(약전)	13.0mg
판토텐산칼슘(약전)	15.0mg
염산피리독신(약전)	2.0mg
엽산(약전)	0.25mg
초산토코페롤 50%(식약청고시 제98-127호)	20.0mg
(비타민E로서 10IU)	
아스코르빈산 97%과립(별규)	72.1mg
(아스코르빈산으로서 69.94mg)	
비오틴(U.S.P.)	0.03mg
피토나디온 5%건조분말(별규)	1.00mg
(비타민K로서 0.05mg)	

■ 성상 : 진한갈색을 띤 삼각형의 필름코팅정

■ 효능·효과

- 다음의 경우 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력 저하
- 노년기

■ 용법·용량

8세 이상 및 성인 : 1회 1정씩, 1일 2회 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 과수산뇨증 환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 수유부
- 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.

- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하던 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여합니다.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우에는 레보도파와 병용투여하지 않습니다.

6. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 3) 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.

■ 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사 포장단위

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
 ※ 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 <http://www.dreampharma.co.kr>나 수신자부담문의전화 080-729-5800 에서 확인할 수 있습니다.

※ 설명서 작성년월일 : 2004. 08. 31.
 ※ 설명서 개정년월일 : 2007. 01. 03.