

녹콜에프과립



분류번호 : 114

콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침

일반의약품

【성분 · 함량】 1포종

항소산염조엑스(5.82 →1) (별규)	128.6mg		
향부자(약전)	272.0mg	진피(약전)	204.0mg
자소엽(약전)	136.0mg	감초(약전)	68.0mg
건강(약전)	68.0mg		
에텐자미드(약전)	500.0mg		
dL-염산메칠에페드린(약전)	12.5mg		
구아아폴설펜산칼륨(USP)	80.0mg		
말레인산클로르페니라민(약전)	2.5mg		
카페인(약전)	50.0mg		
브롬화수소산덱스트로메토르판(약전)	15.0mg		

【성 상】 갈색의 과립제

【효능 · 효과】 감기의 증상상

(콧물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법 · 용량】 15세 이상의 성인 1회 1포 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오

어린이 1회

11세 이상 ~15세 미만 : 2/3포 7세 이상 ~ 11세 미만 : 1/2포

3세 이상 ~ 7세 미만 : 1/3포 2세 이상 ~ 3세 미만 : 1/4포

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예를 들면 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영 · 유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 부종이 있는 환자
- 9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오.
진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 2세 미만의 영 · 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 하십시오. 2세 미만의 영 · 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담하십시오.
- 2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감소로서 1g이상인 제제는 장기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압 상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 2) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드제 이뇨제(트리클로로메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 4) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 5) 장기간 계속하여 투여하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관하십시오.

【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포 장 단 위】 자사포장단위

* 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다. 본 제품은 재정경제부 소비자피해보상규정에 의거 보상받으실 수 있습니다.080320



삼익제약주식회사

인천광역시 부평구 청천1동 374-1
학술/개발부 : (02)928-0661