



믿고 복용할 수 있는 임신철분제

헤모에이큐

연질캡슐

헤모에이큐는 철분 보급제로 유효성과 안정성이 뛰어나며 기형아 예방에 필수적인 폴산과 임신시 요구량이 증가되는 조혈비타민을 함유하여 임신부 빈혈에 효과적입니다.

[원료약품 및 그분량] 1캡슐(1,060mg) 중


푸마르산철(철로서 32.9mg)(KP)	100.0mg
아스코르브산(KP)	100.0mg
피리독산염산염(KP)	50.0mg
0.1%시아노코발라민(시아노코발라민으로서 10μg)(KPC)	10.0mg
폴산(KP)	500.0μg
오로트산(KPC)	5.0mg
당귀엑스산(KPC)	10.0mg
천궁엑스산(KPC)	10.0mg
작약엑스산(패오니플로린으로서 0.84mg)(KPC)	10.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	0.48mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산프로필(KP)	0.12mg
첨가제(천연색소) : 카카오색소, 치자청색소	

[성 상] 갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

[효능효과]

1. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
2. 다음 경우의 비타민 B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
3. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염의 완화

[용법용량] 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 식후에 복용



본 제품은 어린이 안전포장으로 설계 생산된 제품으로
'push down & turn cap (아래로 누르고 돌려서 엽니다.)'
방식을 사용하고 있습니다.
※ 개봉시 뚜껑을 누르면서 돌리시기 바랍니다.

[특 징]

1. 헤모에이큐는 철분과 조혈비타민의 복합철분제로 철분의 흡수율이 우수하며 생체이용률이 높기 때문에 임신, 수유시 부족하기 쉬운 철분을 신속히 공급합니다.
2. 헤모에이큐는 조산(조기분만)방지과 기형아예방을 위해 임신부에게 적극 권장되는 폴산과 조혈비타민인 피리독산염산염, 비타민 B₁₂가 함유되어 있어서 임신부에게 특히 효과적입니다.
3. 헤모에이큐에 포함된 천궁, 당귀, 작약 등은 두통, 어지럼증, 빈혈등에 탁월한 효과가 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 12개월 미만의 영아(젖먹이)
- 3) 혈액소증철 대사이상으로 철이 간장, 췌장(이차)에 침착하는 질환, 헤모시데린 침착증, 비철결핍성 빈혈
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산노증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부, 수유부
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장에(신장장애) 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 구역, 구토, 설사
- 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 3) 피라독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 4) 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.
- 5) 지방 과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 마십시오.
① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
② 레보도파
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

7. 임상검사치에의 영향

각종 뇨검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30캡슐

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[소비자상담 전화번호] 080-550-8308~9

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 설명서 작성일자(2010년 11월) 이후 변경된 내용은 이시드릭(<http://ezdrug.kfda.go.kr/kfda2>)에서 확인하실 수 있습니다.

작성일 : 2010. 11

제조원



경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6

알앤피코리아(주)
제대웅제약 계열사

판매원



주식 대웅제약
경기도 화성시 향남읍 상신리 906-10