

웰비타

연질
캡슐

고단위종합비타민제

일반의약품

분류번호 : 03190

비타민은 건강유지, 질병예방, 발육·성장 및 신체 각종 대사와 기능에 필수적이며 미량으로도 탁월한 효과를 가지는 성분입니다. 이러한 비타민은 체내에서 합성되지 않으므로 섭취를 통해서만 보충해 주어야 하는데 현대인은 불규칙적인 식생활, 인스턴트식품, 다이어트 등의 잘못된 식습관으로 충분한 비타민을 공급받지 못하여 만성피로, 신체대사 이상 등에 시달리고 있습니다.

웰비타연질캡슐은 비타민10여종과 셀레늄(항산화 효과, 노화방지) 등의 미네랄을 처방한 멀티비타민제로 과다한 업무와 스트레스에 시달리는 현대인 뿐만 아니라 수험생, 임신·수유기의 여성, 노년기 까지 남녀노소에 관계없이 꼭 필요합니다. 1일 1회 복용으로 간편하게 효과를 볼수있으며, 연질캡슐 제형으로 비타민의 산화를 방지하여 높은 흡수율과 빠른 효과를 나타낼 수 있는 제품입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(1,420mg) 중

레티놀팔미테이트(KP)(비타민 A로서 2300IU)	1.353mg
콜레칼시페롤농축물(유상형)(BP)(비타민 D로서 200IU)	0.20mg
도코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 10IU)	10.0mg
티아민질산염 (KP)	1.5mg
리보플라빈(KP)	1.2mg
니코틴아미드(KP)	15.0mg
판토텐산칼슘(KP)	30.0mg
피리독신산염 (KP)	1.4mg
0.1% 시아노코발라민(KPC)	2.5mg
(시아노코발라민으로서 2.5μg)	
아스코르브산(KP)	50.0mg
피토타닌5%(KPC)(비타민K로서 55μg)	1.1mg
폴산(KP)	250.0μg
비오틴(USP)	20.0μg
셀레늄함유건조효모(별규)(셀레늄으로서 20μg)	15.38mg
침강탄산칼슘(KP)(칼슘으로서 30.03mg)	75.0mg
무수인산수소칼슘(KP)	102.0mg
(인으로서 23.2mg, 칼슘으로서 30.05mg, 총칼슘으로서 62.6mg)	

푸마르산철(KP)(철로서 10mg)	30.5mg
산화아연(KP)(아연으로서 5mg)	6.2mg
산화제이동(KPC)(구리로서 0.8mg)	1.0mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 6mg)	10.0mg
황산망간수화물(USP)(망간으로서 0.65mg)	2.0mg
첨가제 (천연색소) : 카카오색소, 치자청색소	

【성상】

적갈색의 유상 내용물을 함유한 암갈색의 장방형 연질캡슐

【용법·용량】

12세 이상 어린이 및 성인: 1일 1회, 1회 1캡슐을 식후 복용하십시오.

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 A, D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
 - 육체피로
 - 수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 눈의 건조감 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상)
 - 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방

【사용상의 주의사항】

- 경 고
 - 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신한 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
 - 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하십시오. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skpharma.com)나 제품상담 전용전화를 통해 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품용을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '이디드릭(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보' 를 참조하십시오.

2004. 06. 작성
2011. 02. 개정

판매원  **SK 케미칼** 에스케이케미칼(주)
Life Science Biz.
경기도 안산시 단원구 목대동 47-3

제조원

 경기도 화성시 향남읍 상신리 906-6
알앤피코리아(주)

*자세한 문의는 전화료가 필요없는 고객 상담실을 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무료) : 080-021-3131

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 과칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육경증, 신질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 12개월 미만의 영아(간난이기)
- 4) 윌슨씨병
- 5) 혈액소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 6) 신결석 환자
- 7) 중증(심한 증상)의 신부전 환자
- 8) 임부
- 9) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 10) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)

- 1) 세 미만의 영아(간난이기)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
- 4) 과수산노증환자(hypercalcaemia: 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 5) 임부 · 수유부
- 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환이 있는 환자
- 7) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 8) 신장에(신장장애) 환자
- 9) 저단백혈증 환자
- 10) 갑상샘대체를 투여 중인 환자

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유체를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - ① 구역, 구토, 기어움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절 부종(부기)
 - ② 위부불쾌감, 설사, 묽은변, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)
 - ③ 식욕부진, 복부팽만감
 - ④ 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙
 - ⑤ 두드러기, 광선과민증, 복부 · 위 통증, 상복부통증, 경련, 혼수, 열
 - ⑥ 홍반(붉은반점), 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하
 - ⑦ 피부염, 땀 · 호흡기 악취, 탈모, 조급증
 - ⑧ 위장관 장애, 소화 장애, 폐 부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperursemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 율혈성 신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 9) 장기투여에 의해 과칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조 용법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 항알도스테론제, 트리암테텐과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨 혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용(함께 복용)투여하지 마십시오.
 - ① 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
 - ② 레보도파
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- ## 7. 임부 · 수유부에 대한 투여
- 1) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 증상으로 하는 기형 발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 마십시오. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의 하십시오.
 - 2) 비록 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

8. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 뇨검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 뇨를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용), 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 30캡슐