시트라칼디 정

(구연산칼슘 710mg, 콜레칼시페롤 과립 2mg) 일반의약품

Sitracal D Tab. 분류번호 321

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

▪ 원료약품의 분량 : 1정중

구연산칼슘 (유.에스.피.) ..... 710 mg
(칼슘으로서 149.7 mg)
콜레칼시페롤 과립 (식약청고시) ..... 2 mg
(비타민D로서 200 I.U.)

▪ 성 상

백색의 장방형 정제

▪ 효능 • 효과

1. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급
2. 다음 경우의 비타민 D의 보급
   1) 임신 · 수유기
   2) 발육기
   3) 노년기
3. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
   비타민 D (콜레칼시페롤) : 뼈 · 이의 발육불량, 구루병의 예방

▪ 용법 • 용량

12세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1정을 복용합니다.

▪ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 과칼슘혈증 (hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
   2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   3) 3개월 미만의 영아
   4) 12개월 미만의 영아
   5) 신결석 환자
   6) 중증의 신부전 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오 (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
   1) 1세 미만의 영아
   2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피하십시오.
   4) 임부, 수유부
   5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
   6) 신장애 환자
   7) 저단백혈증 환자
   8) 강심배당체를 투여중인 환자

3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
      ① 비타민 D 함유제제 : 구역, 구토, 설사
      ② 칼슘함유제제 : 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 구역질, 구토, 피부발진
   2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
   2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호 작용
   1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
   2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 마십시오.
      ① 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
      ② 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 임부 · 수유부 · 미숙아 · 유아에 대한 투여
   비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

▪ 포 장 단 위

60정, 90정, 180정, 270정

▪ 저 장 방 법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

※ 약은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 · 병의원 · 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발부로 문의하여 주시기 바랍니다. (전화 : 02-3415-7851)

작성년월일 : 2006.01.16

제조 · 판매원
대한뉴팜(주)
경기도 화성시 향남면 상신리 904-3