

변비 치료제

센토실정

비사코딜/도큐세이트나트륨
/ 대황엑스 / 센나엑스
/ 천궁건조엑스

KGMP

우수 의약품 지정업체

변비 치료제

센토실정

Sentosil Tab.

일반의약품

분류번호 02380



■ 성분 · 함량 1정 중 비사코딜(KP) 6mg / 도큐세이트나트륨(USP) 20mg / 대황엑스(KHP) 22mg
센나엑스(별규) 11mg / 천궁건조엑스(별규) 134.5mg
침가제(타르색소): 청색 1호/황색 203호

■ 성상 녹색의 원형 장용성 당의정

■ 효능 · 효과 * 변비

* 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

■ 용법 · 용량

만 15세 이상: 1회 1~2정씩 1일 1회 취침시 복용한다.
만 11세 이상 - 만 15세 미만: 1회 1/2정~1정씩 1일 1회 취침시 복용한다.
만 7세 이상 - 만 11세 미만: 1회 1/2정 ~ 1정씩 1일 1회 취침시 복용한다.
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환 (중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색(창자마힘) 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

저산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 복통, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 1주 정도 부여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜라.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
 - 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다.
만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 비꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 · 사용기간 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월 ■ 포장단위 자사기준

▷ 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(<http://www.koreaprime.co.kr>) 나 제품문의처(02-848-8487)에서 확인 할 수 있습니다.

연락처 (02)848-8487 / 소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

본 의약품은 엄격한 품질관리하에 제조된(K.G.M.P)적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정일자: 2014.01.09



제조사: 연세약품

한국프라임제약

전라북도 원주군 봉동읍 원주산단9로 100