

【원약품 및 분량】 1정중
 장티푸스(인진) 125.0mg
 캄보티아(인진) 125.0mg
 아세트아미노펜(인진) 150.0mg
 -라보락소(참가제) : 정액1호

에티피마이드(인진) 250.0mg
 케페린(인진) 25.0mg

【성상】 이 약은 연색상의 장방형 필름코팅형이다.
 【효능·효과】
 1. 두통, 치통, 발치후 통증, 인후통, 귀의 통증, 신경통, 관절통, 근육통, 요통, 간통, 타박상, 골절통, 감진통, 월경통(생리통), 외상통의 진통 2. 오한, 발열시의 해열

【용법·용량】
 보통성인 1회2정, 1일2회(가장) 공복시를 피하여 복용한다.
 복용간격을 6시간 이상으로 한다.
 어린이 1회 11~14세 1/4정, 7세~10세 1정
 【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용상주의사항】

- 경고
 매일 3잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 주의 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발 될 수 있다.
- 다음 사람은 복용하지 말 것
 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상 (예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종 (후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
 3) 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 1) 복인, 양진 또는 항체들이 두드러기, 점속성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상 (예, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 수도 또는 인플루엔자 에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 4세 이하의 어린이 4) 간장, 신장, 간상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람 5) 용이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 상감에 장애가 있는 사람 또는 고령자 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 8) 할안이 높은 환자 또는 고령자 9) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 10) 부종이 있는 환자 11) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 4) 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 말 것 : 진해거담제, 다른감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제등 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것
 5) 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것
 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배고근라, 현기증등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 2) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 3) 장기간연용하지 말 것 4) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타나고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타나는 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것 ① 이 약의 복용후 코로피로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나

는 경우 ② 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 3) 천식이 나타난 경우 4) 비르비탈계 약을, 심하게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성의 인독성을 증가시킬 수 있다. 6) 월경통약용제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제 (푸로세미드, 에타크린산) 또는 차이지드계 이뇨제(트리아올로르에타지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근경증이 나타나기 쉬우므로 신중히 부여할 것.
 6) 다중과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 7) 본제의 복용에 의해 노양이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것 2) 위알도스테론증 : 혈 최대 복용량이 감소로서 1g 이상의 제제는 정기 연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증 이 나타날 수 있으므로, 관할(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것 3) 근경증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근경증이 나타나는 경우가 있으므로, 관할을 충분히 하고 오약상, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

- 지장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
 ※의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭 (<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품정보」 를 참조하세요
 [제조자]통림무약(주)
 /경기도 화성시 향남면 상산리 906-1
 [제조회사]한국인스팜(주)



인스팜

Ins0090319

일반/114 12정

두통, 치통, 생리통 Inспен Tab.

인스펜

효과 빠른 두통약 ~

정부공인
 KGMP
 적격지정업체

KOREA INs Pharm

사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드리겠습니다.
 LOT NO. : 9001
 사용기한 : 2012.03.18

www.inspharm.co.kr
 서울특별시 강남구 테헤란로 565-15 (테헤란동) 인스팜(주)
 대표이사: 최준근, 대표이사: 최준근, 대표이사: 최준근