

혼합 비타민 · 미네랄 제제 스트레스탑스® 플러스정

일반의약품

High-Potency Stress Formula

약효분류번호: 316 (혼합비타민제)

【성 상】

밝은 살구색의 타원형 필름코팅정입니다.

【원료약품의 분량】 -1정 중-

질산치아민 98%과립 (별규)	14.856mg
(질산치아민으로서 14.6mg)	
리보플라빈 (USP)	10mg
엽산피리독신 98%과립 (별규)	6.222mg
(엽산피리독신으로서 6.1mg)	
시아노코발라민 1% (별규)	1.2mg
(시아노코발라민으로서 12μg)	
아스코르빈산 90%과립 (별규)	555.556mg
(아스코르빈산으로서 500mg)	
초산토코페롤 50%과립 (별규)	60mg
(초산토코페롤로서 30IU)	
비오틴 1% (별규)	4.5mg
(비오틴으로서 45μg)	
엽산 (USP)	0.4mg
니코틴산아미드 (USP)	100mg
판토텐산칼슘 (USP)	21.737mg
산화제이동 (USP)	3.756mg
(동으로서 3mg)	
산화아연 (USP)	29.749mg
(아연으로서 23.9mg)	

【효능 · 효과】

다음 경우의 비타민 및 무기질의 보급: 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시

【용법 · 용량】

성인 1일 1회 1정을 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 12개월 미만의 영아
 - 월경불순
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 과산화노증환자 (hyperoxaluria: 뇨 중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 임부, 수유부
 - 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
- 이상반응
 - 이 약 투여에 의해 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사 또는 붉은 변, 구내염, 식욕부진, 복부팽만감, 상복부 통증, 혼수, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하도록 하십시오.
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
 - 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 엽산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고, 당내성 손상 (glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증 (hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있습니다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 상호작용
 - 황알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
 - 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않습니다.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
- 임상검사치에의 영향
 - 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 오남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관

【사용기한】 외부포장을 참조하십시오.

【포장단위】 60정

소비자 상담: 마케팅부(Tel: 02-3468-7121 ~ 5)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

※등록상표

4124 REV-01/06 K-1

제조원

Wyeth Taiwan Corp.
290-1, Chung Lun, Chung Lun Village,
Hsinfeng, Hsinchu Taiwan

수입 · 판매원

Wyeth® 한국와이어스
경기도 군포시 당정동 59 - 5

※ 본 제품을 사용하시기 전에 설명서의 내용을 주의깊게 확인하시고, 설명서는 제품과 함께 보관하시기 바랍니다.

17335711