

케어본플러스^정

일반의약품

분류번호 316

[혼합비타민제(비타민A,D 혼합제제를 제외)]

케어본플러스정은 천연칼슘과 기타 미네랄, 콜라겐 등의 유기물을 함유한 오소판 물질과 칼슘의 흡수를 도와주는 비타민D, 항산화 작용을 하여 노화를 예방하는 셀레늄 등을 함유하여, 뼈를 위한 최적의 영양을 공급합니다. 폐경 여성의 골다공증(뼈연성증) 예방과 갱년기 증상 완화에, 성장기 청소년의 건강한 뼈 성장에, 골밀도 감소가 급격히 일어나는 노년층의 골절 예방과 신경통, 관절통의 완화 기능을 가진 제품입니다.

원료약품의 분량 (1정중)

오소판물질(KPC)(칼슘으로서 75.5~102.1mg)...	415.0mg
50%초산토포페롤(KPC)	200.0mg (비타민D로서 100 IU)
셀레늄함유건조효모(KPC).....	23.2mg (셀레늄으로서 12.5μg)
산화마그네슘(KP).....	20.0mg (마그네슘으로서 12.06mg)
티아민질산염(KP) (비타민B1).....	15.0mg
리보플라빈부티레이트(KP) (비타민B2).....	2.0mg
콜레칼시페롤과립(KPC) (비타민D로서 100 IU).....	1.0mg
첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호, 청색2호	

성상

이 약은 녹색의 타원형 필름코팅정입니다.

IDP·C

효능·효과

1. 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방
2. 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화:
어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
3. 다음 증상의 완화:
신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통(어깨결림) 등)
4. 각기
5. 칼슘 결핍 및 기타 칼슘의 보급

용법·용량

만 12세 이상 성인: 1일 2회, 1회 2정씩 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후
복용하시기 바랍니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1)과칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
2)이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민증이 있는 환자
3)만 1세 미만의 영아(갓난아기)
4)신결석 환자
5)중증(심한증상)의 신부전 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
(복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오)
1)의사의 치료를 받고 있는 환자
2)햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는
비타민D 또는 칼슘의 투여를 피합니다.
3)수유부 4)심장·순환기계기능 장애 환자
5)신장에(신장장애) 환자 6)저단백혈증 환자
7)강심배당체를 투여 중인 환자 8)위장관 질환
9)임부
3. 부작용
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
위부 불편감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동 불규칙, 구역질, 피부발진, 홍반, 부전수축, 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증

- 2) 이 약의 복용에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 대량 복용으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 5) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여합니다.
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
5. 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여(함께 복용)하지 않습니다. : 안산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후 후에는 피하십시오.
6. 임부·수유부·미숙아·유아에 대한 투여
비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
7. 임상검사치에의 영향
요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
8. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관합니다.
3) 오염(질똥사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않습니다.
※제품 개봉 또는 취급시에 포장재(알루미늄 호일지)로 인하여 상처를 입을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
※개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나, 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
※습기, 열, 빛은 약의 효과와 안전성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의 바랍니다.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위 : 120, 240정

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2011년 6월 20일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 양재동 60 (전화)02-526-3114
공장: 경기도 안성시 신건지동 60-1
소비자상담실: (전화) 080-022-1010(수신자부담)

※5030339-1110620