

마이락스^산

(폴리에틸렌글리콜 3350)

효과 빠른 변비치료제

전문약약품

분류번호 238

MYLAX^산

원료약품 및 그 분량 1포 중

폴리에틸렌글리콜3350(N.F) 17g

성상

백색 내지 미백색의 결정성 분말

효능효과

변비 치료

용법용량

보통 1일 17그램을 약 240밀리리터의 물, 주스, 소다, 커피, 차 등에 녹여서 복용해야 합니다. 장 운동을 일으키는 데 2~4일(48시간)에서 96시간 정도 소요됩니다.

* 1일 허용량제한

아스파탐 함량 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 한 최소량 사용)할 것.
60kg 성인 1일 최대복용량 2.4g (이 약 17.085g 중 아스파탐 0.051g 함유)

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 장폐색이 있거나 의심되는 환자
- 2) 폴리에틸렌글리콜에 알러지가 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 소화기계 : 메스꺼움, 복통, 구토 또는 고창이 나타날 수 있습니다.
- 2) 과량투여시 특히 고령자에게 설사 및 빈변을 유발할 수 있습니다.
- 3) 폴리에틸렌글리콜을 투여하는 경우 종종 알러지 반응이 나타날 수 있습니다.

3. 일반적주의

- 1) 환자에게 좋은 배변과 식습관(고섬유질 식이요법) 및 생활태도(적절한 식이섭취 및 음료의 섭취, 규칙적인 운동)가 규칙적인 장 운동에 필요함을 주시킵니다.
- 2) 이 약은 배변을 부드럽게 만들고 배변 내에 물을 보유시킴으로써 장운동의 빈도수를 증가시킵니다. 만약 갑자기 복통, 복부팽만, 또는 설사 증상이 나타나면 의사와 상의해야 합니다.
- 3) 이 약은 2주 또는 그 이하의 기간 또는 의사에게 지시 받은 기간 동안만 사용되어야 합니다.
- 4) 이 약의 장기복용, 과다복용 또는 빈번한 사용은 전해질 불균형과 완하제에 대한 의존성을 유발할 수 있습니다.

4. 상호작용

특별한 약물상호작용에 대하여 알려진 바 없습니다.

5. 임부에 대한 투여

동물을 대상으로 한 이 약의 생식독성시험은 수행되지 않았습니다. 임부를 대상으로 한 연구가 없으므로 의사의 판단하에 명백히 필요한 경우에만 임부에게 투여 해야 합니다.

6. 소아에 대한 투여

소아 환자에 대한 안전성과 유효성은 확립되지 않았습니다.

7. 고령자에 대한 투여

고령자에 투여시 특별한 고려사항은 없으나, 만약 설사 증상이 나타나면 사용을 중지해야 합니다.

8. 임상검사치에의 영향

임상적으로 의미있는 효과는 나타나지 않았습니다.

9. 과량투여시의 처치

사고로 인한 과량 투여는 보고된 바 없으나, 충분한 수분을 섭취하지 않고 이 약을 과량 복용할 경우 설사로 인한 탈수증상이 나타날 수 있습니다. 이 때 약물의 투여를 중지하고 수분을 충분히 섭취하여야 합니다. 마우스와 랫트, 토끼에서 경구 LD₅₀은 50g/kg 이상입니다.

10. 약물상상의 주의

이 약은 가루 형태의 약물로 물이나 주스, 탄산수, 커피, 차에 녹인 후 경구로 투여해야 합니다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 주의해야 합니다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣지 않도록 주의해야 합니다.

12. 기타

동물을 대상으로 한 장기간의 발암성, 유전독성 및 생식독성연구는 수행되지 않았습니다.

13. 경고

이약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

저장방법

밀폐용기, 25°C 보관

포장단위

14포

• 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

• 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담후 사용하십시오.

• 본 제품의 품질관련 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 02714-0091로 연락하시기 바랍니다.

• 만약 구입시 사용요청이있거나 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용하지 마시고) 구입처에서 교환하시기 바랍니다.
• 본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구전화 080-719-2000를 운영하고 있습니다.

• 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서 개정년월일(2007.10.9)후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnl.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조판매회

건일제약(주)
KUHNIL
총판 한한시 직산을 군서로 297-5

첨부문서 개정년월일 2007.10.9
201135-03(일)