



코큐텐 화이트정

(코엔자임Q10 · 우루소데스옥시콜린산 · L-시스테인 · 비타민 C)

사용전에 사용설명서를 주의깊게 읽어 보십시오.

사용설명서를 반드시 제품과 함께 보관 하십시오.

【성분 · 함량】 - 1정(281mg)중 -

코엔자임Q10(유비데카레논)(약전)	1.66mg
우루소데스옥시콜린산(약전)	5.00mg
L-시스테인(디.에이.비)	20.00mg
아스코르빈산과립97% (아스코르빈산으로서 83.34mg)(별규)	85.92mg
질산치아민(약전)	1.67mg
50%초산토코페롤(비타민E로서 1.67 IU)(케이피씨)	3.34mg
리보플라빈3배산(리보플라빈으로서 0.84mg) (케이피씨)	2.52mg
판토텐산칼슘(약전)	5.00mg

【성 상】 흰색 내지 옅은 흰색의 원형 필름 코팅정입니다.

【효능 · 효과】

1. 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
2. 잇몸출혈 · 비출혈 예방
3. 다음경우의 비타민의 보급: 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 노년기

【용법 · 용량】 8세 이상 어린이 및 성인: 1회 2정, 1일 3회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자분에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자분
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자분에는 신중히 투여하십시오. (복용전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 분
 - 2) 과산화노증환자분(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부, 수유부
3. 부작용
 - 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하시고 의사 또는 약사와 상의 하십시오.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
 - 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자분이 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
4. 일반적 주의
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
 - 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 임상검사치에의 영향

- 1) 각종 요검사치에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 넘용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 하십시오.

【포장단위】 자사 포장단위(외부용기에 표시)입니다.

【사용기간】 제조일로부터 24개월 입니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

만약 구입시 유효(사용)기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패등의 정당한 소비자 피해에 대해서는 재정경제부고시(소비자 피해보상규정)에 의거 구입처를 통하여 즉시 교환 또는 환불하여 드립니다.

※ 소비자상담 전화번호 : 080-550-8308~9



주식 **대웅제약**
경기도 화성시 향남면 상신리 906-10

설명서작성년월일 : 2005.07.05

설명서개정년월일 : 2005.12.05

제품의 사용기한은 외부용기에 표기

※ 이 첨부문서 개정년월일 후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.