

일반의약품

1000정
조제용

체비거정

방풍통성산건조엑스

 마더스제약

【원료약품 및 그 분량】 1정 중 · 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.64→1)(별규) ... 237.50mg · 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유) · 첨가제(타르색소) : 황색203호(알루미늄레이크) · 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 탭크, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 【성상】 연한 연두색의 원형 필름코팅정 【효능·효과】 배에 피하지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비 【용법·용량】 보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다. 【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 충혈작용에 의해 유·조산의 위험이 있다.) 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논은 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.) 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 설사약 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장병 환자 3) 부종 환자 4) 고령자(일반적으로 고령자는 생리 기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의할 것.) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.) 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 9) 병후의 쇠약, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.) 10) 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신 탈력감 등이 나타날 수 있다.) 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자 12) 배뇨장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 13) 갑상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.) 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자 15) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.) 16) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 자질성 유전을 신중히 투여해야 하는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시, 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등 (4) 피부 : 발진, 발적, 가려움 등이 나타나는 경우 (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른 맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등 (6) 비뇨기계 : 배뇨장애 (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. 2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다. 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것. 4) 다른 한약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용투여 시 특히 주의할 것. 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감람하는 등 신중히 복용할 것. 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리잔산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로로메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 7) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자(이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃) 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【제조사】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53 【제조외리자】 (주)마더스제약 / 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18 * 소비자 상담실 : 070-7457-8819 * 의약품 정보참조 : <http://nedrug.mfds.go.kr> * 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330) (작성일 : 2023년 05월 08일)

제조번호 :
사용기한 :

확인공간
35 x 18mm
(인쇄시 점선 및 문구 삭제)

