

에스-클리어 젤

흉터전문치료제

일반 의약품
분류번호:490 (기타의 조직세포의 기능용의약품)

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관 하시기 바랍니다.

에스클리어젤은 양파추출물, 헤파린나트륨, 알란토인을 주성분으로 하는 흉터전문치료제입니다. 에스클리어젤은 상처가 아물어 형성되는 흉터에 섬유아세포의 과증식을 억제시켜 주며 콜라겐과 같은 결합조직이 정상화 되도록 도와 가급적 흉터가 남지 않게 합니다. 이미 생긴 흉터와 상처 후 생성되는 켈로이드의 생성을 막아주고 켈로이드 제거에도 효과가 있습니다. 에스클리어젤은 수술로 인한 흉터, 피부이식 후 접합 부위 흉터, 화상으로 인한 흉터, 각종 일상생활에서의 크고 작은 사고로 생긴흉터, 보기 흉한 켈로이드 등의 피부를 깨끗하게 치료할 수 있도록 도와 줍니다.

【원료약품 및 그분량】 1g 중

주성분: 헤파린나트륨(별규)..... 50.0 I.U

(헤파린나트륨으로서 0.4밀리그램)

주성분: 양파추출액(생규)..... 100.0mg

(스피레오시드로서 2.0 마이크로그램)

주성분: 알란토인(USP)..... 10.0mg

보존제: 파라옥시벤조산프로필(KP)..... 0.2mg

보존제: 파라옥시벤조산메틸(KP)..... 1.8mg

동물유래성분(기원동물 및 사용부위) : 헤파린나트륨(식용동물의 간, 폐 또는 장점막)

【성 상】 갈색의 자스민향이 있는 반투명한 젤

【효능·효과】

수술, 절단, 화상, 사고후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부손상시의 상처 및 흉터, 외상성 경축, 상흔성 협착

【용법·용량】

상처부위에 충분히 침투할 때까지 1일 수 회 가볍게 마사지 하십시오. 상처가 심하거나 오래된 흉터 일 경우 드레싱으로 고정하여 하루 저녁을 지냅니다. 갓 생긴 상처의 경우,극도의 추위, 자외선, 강한 마사지 등 신체적 자극을 피하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 파라옥시안식향산메칠 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2) 임부

3) 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위를 가진 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

수유부

3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 장기간 사용 후 내성(견딜, 허용, 관용)이 나타날 수 있으므로 주의할 것.

2) 매우 드물게 국소(부분) 피부자극이 나타날 수 있으므로 주의할 것(국내에서 647명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 가려움 7건, 과민반응 1건이 보고되었다.)

3) 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의할 것. 갓 생긴 상처의 경우 극도의 추위나 자외선 또는 강한 마사지 등 물리적 자극을 피할 것.

4) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.

5) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는신중히 투여한다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 20g

DS-1404-02

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 “품목별 소비자 분쟁해결기준”에 의거 정당한 피해는 보상하여드립니다.

첨부문서 최초 작성연월일 2006. 01. 10

첨부문서 최종 개정연월일 2014. 04. 11

이 첨부문서의 작성일 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(<http://www.dongsung-pharm.co.kr>)또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 해당 제품정보란에서 확인하실 수 있습니다.

제조 및 판매원



동성제약주식회사

공장 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

본사 : 서울 도봉구 도봉로 683(방학동)

소비자상담전화 : 080-001-0921

www.dongsung-pharm.co.kr