



일반의약품
분류번호 114

기침 감기약

DUCAPS-PLUS

두캡스 플러스 캡슐

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

두캡스플러스캡슐은 인후통, 해열, 기관지이완 성분이 골구루 배합되어 있어 기침, 가래에 효과가 뛰어난 기침 감기약입니다. 또한 캡슐제이므로 휴대가 편리하여 더욱 손쉽게 복용할 수 있는 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

주성분: 아세트아미노펜(KP) 200.0mg
주성분: 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) 8.0mg
주성분: 구아이페네신(KP) 40.0mg
주성분: 염산슈도에페드린(USP) 10.0mg
착색제(타르색소): 황색203호, 청색1호

【성상】 흰색의 분말 또는 과립이 들어있는 상부 녹색, 하부 흰색의 경질 캡슐제

【효능·효과】 감기·제증상(코물, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】

- 15세이상성인: 1회 2캡슐 1일3회 식후 30분 복용,
- 8세~15세미만: 1회1캡슐 1일3회 식후 30분 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키지 쉬운 체질을 가진 사람
- 2) 지금까지 이약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 6) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)

등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것
- 2) 다음의 약들과는 동시에 복용하지 말 것. 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임 하에 복용시킬 것
- 4) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 여러 차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 3) 장기 연용 하지 말 것.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐

*어린이 안전용기(Hard push foil)를 사용한 제품입니다.

개봉시, 제품 파손이 우려되므로 뒷면의 은박(foli)부분을 손톱으로 눌러 (가급적 제품의 중앙부분을 피하여) 개봉합니다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시*품목별 소비자 분쟁해결기준*에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

DS-1410-02

첨부문서 최초 작성년월일 2008. 03. 27

첨부문서 최초 개정년월일 2014. 10. 02

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

【제조 및 판매원】

 **동성제약주식회사**

【본 사】 서울시 도봉구 도봉로 683(방학동)
【공 장】 충남 아산시 둔포면 관대안길 45
【청소년자 상담번호】 080-001-0921
【사이트】 www.dongsung-pharm.co.kr