

올콜에프 캡슐

올콜에프 캡슐은 감기의 증상상(여러 증상)을 완화하는 성분의 이상적인 배합의 복합감기약으로 한방성분을 포함하지 않아 체질에 관계없이 복용이 가능합니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

아세트아미노펜(KP).....	200mg
dl-메틸에페드린염산염(KP).....	12.5mg
수도에페드린염산염(USP).....	15mg
카페인무수물(KP).....	25mg
클로르페니라민말레산염(KP).....	1.25mg
구아이페네신(USP).....	41.5mg

【성 상】 백색 분말을 함유하는 상 · 하부 미백색의 경질캡슐제 (TG ACF)

【효능 · 효과】

감기의 증상상(여러 증상)콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

【용법 · 용량】 성인 1회 2캡슐, 1일 3회 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의할 것. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) · 유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장, 신장(콩팥), 간상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자(노인)
- 6) 녹내장(예: 눈의 동통(통증), 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 뚫)곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

4. 부작용

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
-이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
-고열을 수반하여 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신(온몸)피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
-천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- 3) 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 4) 다음 약물과는 동시에 복용하지 말 것.
: 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등
- 5) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 책임하에 복용시킬 것.
6) 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아(갓난아기)에게는 부득이한 경우를제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
5. 복용 중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.
1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 뚫)곤란, 현기증(어지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
3) 여러차례 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
4) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오염(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10캡슐

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질 · 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 가까운 약국에서 구입하세요.

- * 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 사용 전에 반드시 설명서를 읽고, 사용 후에는 제품과 함께 보관해 주십시오.
- * 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- * 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → [정보마당] → [의약품등 정보]를 참조하십시오.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알려 주십시오.

제조 · 판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 상신리 907-4
☎ 고객상담전화 080-300-8282
Ⓜ <http://www.taiguk.co.kr>

첨부문서 개정년월일: 2011. 09. 22