

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

- 유효성분 : 우레아(요소)(KP) 200mg
- 첨가제(보존제) : 벤질알코올(KP) 2mg
- 첨가제(동물유래) : 스쿠알란 (기원동물 : 상어, 사용부위 : 간유)
- 기타 첨가제 : 글리세린, 글리세린모노스테아레이트, 덱스판테놀(D-판테놀), 미리스트산이소프로필, 백색바셀린, 세틸팔미테이트, 스테아르산, 스테아릴알코올, 유동파라핀, 정제수, 토코페롤아세테이트, 파라핀

[성 상] 전질균등한 백색의 크림제

[효능·효과] 진행성 지장각피증(주부습진의 건조형), 손·발바닥 각피증, 어린선(魚鱗癬), 노인성 건피증(피부건조증), 모공성 태선, 아토피피부

[용법·용량] 1일 1~수회(여러 차례) 환부(질한 부위)를 씻은 다음 이 약을 바른후 충분히 문지른다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.

- 1) 안점막등의 점막
- 2) 이 약 성분에 과민증 환자
- 3) 급성 습진 또는 염증성 피부 질환 환자
- 4) 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다.)
- 2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다.)

3. 부작용(이상반응)

- 1) 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극 증상이 일시적으로 나타나거나 투여초기에 나타날 수 있다.
- 2) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 구진, 따끔따끔한 느낌, 작열감(화끈감), 인설(비늘, 껍질), 드물게 부종(부기), 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

4. 상호작용

- 이 약에 의해 코르티코이드, 디트리놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.

5. 적용상의 주의

- 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
- 2) 궤양, 미란(긁무름), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.
- 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 50g / 튜브

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 09. 28

제조사
태극제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>