

간장질환치료제 헤파탄 골드 연질캡슐

분류번호 : 391(간장질환용제)

헤파탄골드 연질캡슐은 간세포를 각종 독성물질로부터 보호하고 간대사에 필수적인 물질을 다량 함유함으로써 만성 간질환을 비롯, 여러 간장질환에 복합적인 효과를 나타내도록 처방된 제제입니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(DAB)	100mg
염산치아민(약전)	4mg
리보플라빈(약전)	4mg
염산피리독신(약전)	4mg
니코틴산아미드(약전)	12mg
판토텐산칼슘(약전)	8mg
0.1%시아노코발라민(식품의약품안전청고시)	1.2mg
(시아노코발라민으로서 1.2 μ g)	
청색1호, 황색5호, 황색203호 함유	

【성상】

황갈색의 내용물이 든 일면 녹색, 일면 황녹색의 장방형 연질캡슐제

【약리작용 및 특징】

1. 카르두스마리아누스엑스의 실리마린 및 실리빈은 대표적인 간세포보호물질로서, 특히 간의 세포막을 안정화하여 간독성물질로부터 간장을 보호합니다.
2. 헤파탄골드 연질캡슐은 간질환 환자에서 부족되기 쉬운 비타민 B군을 공급하여 간대사가 원활히 이루어지도록 합니다.
3. 헤파탄골드 연질캡슐의 복합적인 간보호 및 간대사촉진 작용은 만성 간질환을 비롯한 여러 간장질환에 우수한 효과를 나타냅니다.

【효능·효과】

다음 질환의 보조 치료 : 만성 간질환, 독성 간질환

【용법·용량】

성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용합니다.
치료 후 복용량을 1~2캡슐로 줄입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않습니다.
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
상당시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 1) 설사
 - 2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
3. 기타 이 약의 복용 시 주의하십시오.
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킵시오.
 - 2) 소아에게 투여 할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 120, 240캡슐

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

설명서 개정년월 : 2008.03

<http://www.myunginph.co.kr>

HGC 0308-04



※ 본 의약품을 사용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고, 본 의약품과 함께 보관하십시오.