

임신부 / 수유부 / 심장기 / 철 결핍성 빈혈

헤포틴 캡슐

임신부
수유부
심장기
철 결핍성 빈혈

헤포틴캡슐은 인체 내 저장철인 페리친과 유사한 구조를 가진 철만나돌난단백 성분의 철분공급제로서, 체내의 철분요구량이 증가할 때 결합하고 있던 철분을 유리시켜 빠르게 혈중 철 농도를 회복시킬 뿐 아니라, 산성인 위에서는 자극성 철이온이 유리되지 않아 위장장애를 최소화합니다. 또한 조철 비타민인 폴산과 시아노코발라민을 함유하고 있어 철 결핍성 빈혈 및 철분과 비타민이 요구되는 임신·수유기의 철 결핍성 빈혈 치료에 안심하고 사용할 수 있는 제품입니다.

성상	갈색의 내용물이 충전된 상, 하부 적색 캡슐
성분·합량	1캡슐 중 철만나돌난단백(별규) 150mg (철(II)로서 20mg) 시아노코발라민(KP) 500µg 폴산(KP) 400µg 첨가제(타르색소) : 적색 40호
효능·효과	철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료
용법·용량	성인 및 12세 이상 어린이 : 1일 1회 1캡슐 식후 복용합니다.

사용상의 주의사항

- 경고
6세 이하의 어린이가 복용할 경우 독성이 나타날 수 있습니다.
- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
2) 12개월 미만의 영아
3) 혈액소증 (철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 다음환자에는 신중히 투여하십시오. (복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
3) 심장·순환기계 기능장애 환자
4) 신장에 환자
5) 저단백혈증환자

포장단위
저장방법

4. 부작용

- 이 약의 복용에 의해 두드러기, 가려움증, 광선과민증, 복부·위통증, 경련, 구토, 설사, 열, 혼수 등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오
- 임산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유탄성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

5. 일반적인 주의

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 복용시 의사, 한의사, 약사와 상의하여 복용하십시오.

6. 상호작용

- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용하지 마십시오.
-인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피하십시오.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

자사포장단위

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

※ 설명서 개정연월일 : 2008.05.22
P0902-01

 **일양약품주식회사**

경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilmyang.co.kr