

메가헤파TM

연질캡슐

Megahepa[®] Soft Cap.(Cardus marianus Ext.)

간은 영양물질의 대사, 각종 유해물질의 해독, 담즙생성 등 500여가지의 일을 담당하고 있는 인체내에서 가장 중요한 장기중의 하나로서, 단백질 대사과정 중에 생기는 독성물질인 암모니아를 요소로 합성, 배설시키는 Urea cycle의 활성화에 의해 그 해독작용을 나타냅니다. 그러나 과중한 업무로 인한 스트레스, 영양장애, 바이러스감염, 유해물질에 의한 중독 등으로 간이 손상받게 되면 그 기능이 저하되고, 심한 경우 간부전증, 간경변 등의 질환이 발생하게 되며, 이러한 경우 간 고유의 기능인 해독작용을 제대로 발휘하지 못하게 됩니다.

메가헤파[®] 연질캡슐은 예로부터 간장약으로 알려진 카르두스마리아누스의 종자에서 추출한 생약성분인 카르두스마리아누스엑스(실리빈)를 주성분으로 하는 간기능 개선제로서, 간에 유해한 독성물질을 해독시켜 간을 보호하고 간세포막을 안정화시키며 간 조직을 재생시키므로 독성간질환, 만성간염, 간경변의 치료에 도움을 줍니다.

■ 원료약품의 분량

1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(별규).....175.0mg
(실리빈으로서 60mg)

■ 성 상

갈색의 액상 내용물이 든 투명한 갈색의 장방형 연질캡슐

■ 효능 · 효과

다음 질환의 보조 치료 : 독성 간질환, 만성 간염, 간경변

■ 용법 · 용량

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg(또는 실리빈으로서 1회 60mg), 1일 3회 / 유지용량 1회 70mg(또는 실리빈으로서 1회 30mg), 1일 3회[또는 1회 140mg(또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회]복용한다.

(이 약으로서 초기용량 1회 1캡슐씩 1일 3회, 유지용량으로 1회 1캡슐씩 1일 2회)

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 심한 담도 폐쇄 환자

- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부, 수유부
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
4. 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용 시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 포장단위 : 120캡슐

- ※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2006년 1월 1일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)를 통해 알 수 있습니다.

08007

MEM-03-02-1171