

관절통 · 신경통 개선제

조인트Q

연질
캡슐

콘드로이틴 300mg 강화!

조인트큐 연질캡슐은 관절 연골의 구성성분인 콘드로이틴을 고단위 함유하여 연골의 건강에 도움을 주며, 비타민 B군과 감마 오리지놀이 복합 처방되어 혈액순환 및 신진대사를 촉진시킵니다. 따라서, 관절통, 근육통, 신경통 뿐 아니라 말초 혈행장애로 나타나는 어깨 · 목 결림, 수족저림 등에 우수한 개선 효과를 나타냅니다.

[성분 · 함량] 1캡슐(1,500mg) 중

황산콘드로이틴나트륨(KPC)	300.0mg
질산치아민(KP)	12.5mg
조산토포페롤(KP)	50.0mg
니코틴산아미드(KP)	10.0mg
염산피리독신(KP)	25.0mg
판토텐산칼슘(KP)	15.0mg
낙산리보플라빈(KP)	6.0mg
γ-오리지놀(KPC)	5.0mg
시아노코발라민(KP)	30.0μg
이노시톨(KP)	15.0mg

[성상] 황색의 내용물을 함유하는 적색의 연질캡슐제**[효능 · 효과]**

1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, E의 보급: 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후의 체력저하시, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림, 수족냉증
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 건통 등), 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염
 - 각기, 눈의 피로

[용법 · 용량]

8세 이상의 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐을 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.(복용 전 의사 또는 약사와 상의하십시오.)
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부, 수유부

3. 이상반응

- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적
 - 구역, 식욕부진, 복부팽만감, 구토, 묽은변
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
- 3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 염산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 상호작용

이 약을 투여할 경우 레보도파의 약물과 병용투여하지 마십시오.

6. 임상검사치에의 영향

발색 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오 · 남용을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 외부포장에 표기

【포장단위】 60, 120캡슐

※ 이 의약품은 KGMP(우수의약품제조관리기준) 적격업체 의약품으로 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 파손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자피해보상규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자 (2008년 03월 03일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 전화 (031-260-9180)를 통해 확인할수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 사항은 이지드렉(ezdrug.kfda.go.kr)의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청(이지드렉-보고마당-안전성정보-의약품 유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

2008. 3 작성

제조원

(주)서흥갑셀

경기도 부천시 소사구 송내1동 315, 317

판매원

경기도 용인시 기흥구 보정동 303번지



녹십자